# Arzneiverkehr

für

# KRANKENKASSEN.

---

Im Auftrage

des

Verbandes freier Krankenkassen

bearbeitet

von

Dr. DRONKE.

---

HAMBURG 1893.
Commissions-Verlag von **W. Mauke Söhne**
(vorm. **Perthes-Besser & Mauke**)
Grosse Bleichen No. 14.

# Inhalts-Verzeichniss.

# Vorwort.

Seit Jahren mit der Revision von Recepten und Rechnungen über die den Krankenkassen gelieferten Arzneimittel, Verbandstoffe u. s. w. beschäftigt, machte ich sehr häufig die Beobachtung, dass von einzelnen Aerzten bei dem Schreiben der Recepte auf den Kostenpunkt derselben keine Rücksicht genommen wurde.

Wenn auch die Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit als des höchsten Gutes, welches der Mensch besitzt, mit allen Mitteln, welche die Wissenschaft dem Arzte an die Hand giebt, erstrebt werden muss, so ist es doch auch andererseits Pflicht des behandelnden Arztes, auf die Kosten der von ihm eingeleiteten Behandlung Rücksicht zu nehmen.

Es ist wohl anzunehmen, dass eine allenfallsige Vertheuerung der Recepte durch den Arzt gewiss nicht absichtlich geschieht, dieselbe hat wohl andere Gründe; so z. B. die ziemlich verwickelten Verhältnisse über die Preisbestimmung der Arzneimittel und der fertigen Arzneien.

Sucht sich der Studirende der Medicin oder der praktische Arzt in einem der gebräuchlichsten Lehr- oder Handbücher der Arzneimittel und Arzneiverordnungslehre über Preise der Arzneimittel zu unterrichten, so findet er, abgesehen davon, dass dieselben überhaupt Schwankungen ausgesetzt sind, oft genug für ein und dasselbe Arzneimittel ganz verschiedene voneinander abweichende Zahlen angegeben; denn wenn auch in Deutschland ein allgemeingültiges Deutsches Arzneibuch eingeführt ist, so besteht doch noch keine Deutsche Reichs-Arzneitaxe und die Preise der einzelnen Arzneimittel weichen in den verschiedenen deutschen Staaten in vielen Punkten bedeutend voneinander ab.

So kostet z. B.:

| | |
|---|---|
| 1 Gramm Argenticum nitricum fusum | |
| nach der Preussischen Arzneitaxe für 1893 . . . . | 20 Pf. |
| nach der Bayerischen Arzneitaxe für 1893 . . . . | 40 „ |
| und nach der Württembergischen Arzneitaxe für 1893 | 30 „ |

oder z. B.:

| | |
|---|---|
| 1 Gramm Bismutum subnitricum | |
| nach der Preussischen Arzneitaxe für 1893 . . . . | 5 Pf. |
| nach der Bayerischen Arzneitaxe für 1893 . . . . | 6 „ |
| und nach der Württembergischen Arzneitaxe für 1893 | 10 „ |

und es ist nicht leicht, sich aus diesem Labyrinthe von Zahlen herauszufinden.

Die grössten Schwierigkeiten aber treten dem Mediciner dann entgegen, wenn er aus den Preisangaben der einzelnen Arzneimittel den Taxpreis eines Receptes festzustellen sucht, denn die Taxen für Anfertigung der Arzneien und für die zur Verwendung gelangenden Gefässe bilden ein noch viel verwickelteres Kapitel, umsomehr als die für Berechnung der pharmaceutischen Arbeiten und der Gefässe in Betracht kommenden Grundsätze in den verschiedenen Ländern wesentlich voneinander abweichen.

Im Nachstehenden habe ich versucht, an Beispielen, wie sich solche bei der Revision ergaben, dem Praktiker eine Anleitung zur Sparsamkeit bei seinen Verordnungen zur Erleichterung an die Hand zu geben.

Da zur Zeit noch sieben verschiedene Arzneitaxen gültig sind, so mussten bei den Beispielen auch diese sieben verschiedenen Taxen berücksichtigt werden, und wenn auch in Folge dessen die Arbeit einen grösseren Umfang angenommen hat, so war eine derartige Ausdehnung um so nothwendiger, als die Krankenkassen über ganz Deutschland verbreitet sind und die Anleitung für sämmtliche Aerzte in den verschiedenen Staaten des Deutschen Reiches bestimmt ist.

Die Preise der aufgeführten Formulae magistrales sind ebenfalls nach den sieben verschiedenen Taxen berechnet, damit der praktische Arzt sofort den Preis aus der Tabelle ersehen kann.

Dagegen sind in den Handverkaufstaxen für Arzneimittel, Instrumente und Bandagen, sowie Verbandstoffe, nur einfache Preise eingetragen, da die Handverkaufspreise auf Grund freier Vereinbarung festgestellt werden und der officiellen staatlichen Arzneitaxe nicht unterliegen.

Immerhin war es nicht möglich, auf alle Punkte der ökonomischen Receptur aufmerksam zu machen; es werden der Arbeit gewiss noch Mängel anhaften, welche später zu vermeiden oder zu verbessern und zu ergänzen mein Bestreben sein wird und werde ich dankbar jede mir von anderer Seite gegebene Anregung zu Verbesserungen annehmen.

Hamburg, Ende September 1893.

Dr. Dronke.

§ 1.

Bei der Behandlung der Kranken und dem Verordnen der Arzneien soll der behandelnde Arzt in erster Linie sein Augenmerk dahin gerichtet haben, den Kranken möglichst schnell und sicher wieder gesund herzustellen und demselben seine volle Arbeitskraft wieder zu verschaffen.

§ 2.

Der behandelnde Arzt soll in keiner Weise beschränkt sein in der Wahl der Arzneimittel und es wird dem Arzte seitens des Kranken bezw. der Krankenkasse das volle Vertrauen entgegengebracht, dass er bei der Behandlung des Kranken sein ganzes medizinisches Können und Wissen aufbieten werde, um den im § 1 ausgesprochenen Grundsatz durchzuführen.

§ 3.

Bei der Ausübung seines ärztlichen Berufes soll aber der Arzt auch andererseits alle Kosten vermeiden, welche nicht dringend nothwendig sind und welche bei Kenntniss der einschläglichen Verhältnisse und klarer Uebersicht über die letzteren vermieden werden können und müssen. Der Arzt muss um so mehr sein Auge auf eine ökonomische Behandlungsmethode der Kranken richten, als einerseits die Mittel der Krankenkassen aus den Beiträgen der Minderbegüterten aufgebracht werden und die Höhe dieser Beiträge durch das Gesetz genau begrenzt ist und als andererseits durch eine weniger ökonomische Behandlungsmethode die Krankenkassen schliesslich gezwungen werden, nach allen Seiten, d. h. auch an dem Honorar der Aerzte selbst zu sparen.

§ 4.

Zum Zwecke einer grösstmöglichen ökonomischen Behandlung verschaffe sich der Arzt eine genaue Kenntniss des in ganz Deutschland gültigen Deutschen Arzneibuches, sowie eine eingehende Kenntniss der in demjenigen Lande, in welchem er die ärztliche Praxis ausübt, gültigen Arzneitaxe. Die Kenntniss der Arzneitaxe ist um so nothwendiger, als zur Zeit im Deutschen Reiche noch sieben verschiedene Arzneitaxen gültig sind, deren einzelne Bestimmungen sich zum Theil widersprechen.

§ 5.

Zur schnelleren Uebersicht über die verschiedenen Arzneitaxen und zum besseren Verständniss der später folgenden „Anweisungen zur Sparsamkeit“ sei hier eine kurze Zusammenstellung der wesentlichsten Punkte der verschiedenen Arzneitaxen gegeben.

Die zur Zeit in Deutschland gültigen sieben verschiedenen Arzneitaxen:

a) die Königlich Preussische, ebenfalls gültig im Grossherzogthum Baden,
Grossherzogthum Oldenburg,
Herzogthum Braunschweig,
Fürstenthum Waldeck,
den sächsischen Fürstenthümern und
den freien Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck;
b) die Königlich Bayerische;
c) die Königlich Württembergische;
d) die Königlich Sächsische;
e) die Grossherzoglich Hessische;
f) die Grossherzoglich Mecklenburgische;
g) die Reichsländische Taxe

enthalten in den respektiven Einleitungen zunächst

## Allgemeine Bestimmungen:

I. Der niedrigste Preisansatz ist bei den Taxen a), c), e) und f) 3 Pf. [Taxe e) enthält für einzelne Arzneimittel einen Minimalpreis von 10 Pf.], bei g) 5 Pf., dagegen bei den Taxen b) und d) 5 Pf. für diejenigen Mittel, welche in den Tabellen B und C des Deutschen Arzneibuches aufgeführt sind, insofern bei einzelnen derselben nicht ein Minimalpreis von 10 Pf. in der Taxe angegeben ist, und 3 Pf. für die übrigen Arzneimittel.

II. Im Falle bei einem Arzneimittel nur ein Preis angegeben ist, so findet dieser eine Preis nach den Taxen a), e), f), und g) für jede Menge des betreffenden Mittels Anwendung, während in diesem Falle nach den Taxen b), c), und d) eine Preisermässigung dahin eintritt, dass bei Verordnung der zehnfachen Menge und darüber nur Achtzehntel des einfachen Preises als Grundpreis angenommen wird.

Es kostet z. B. nach den Taxen b) und c) 1 Gramm Kalium jodatum 10 Pf., und es würden also 10 Gramm 100 Pf. kosten; dieselben dürfen aber nur mit 80 Pf. berechnet werden; desgleichen kosten 12 Gramm Kalium jodatum nicht 120 Pf., sondern nur 96 Pf.

Sind dagegen bei einem Arzneimittel zwei verschiedene Preise, der eine niedrigere Preis für grössere Mengen, der andere höhere Preis für geringere Mengen, angegeben, so darf dieser höhere Preis nur so weit in Anwendung kommen, bis der durch Vervielfältigung des Taxpreises der kleineren Gewichtsmengen erhaltene Preis den Taxpreis für grössere Gewichtsmengen nicht überschreitet. So kostet z. B. nach Taxe **a**) 1 Decigramm Argent. nitric. 5 Pf., es würden also 9 Decigramm 45 Pf. kosten; da aber für 1 Gramm ein Taxpreis von 20 Pf. ausgeworfen ist, so darf von 4 Decigramm an bis zu 1 Gramm nur 20 Pf. berechnet werden.

Ferner kosten z. B. nach Taxe **e**) 10 Gramm Chloroform 15 Pf., aber für 100 Gramm ist der Taxpreis von 100 Pf. ausgeworfen; es dürfen somit 70 Gramm nicht mit 105 Pf., sondern nur mit 100 Pf. taxirt werden. Es kostet nach Taxe **a**) 1 Centigramm Apomorph. hydrochl. 5 Pf., während 1 Decigramm nur 20 Pf. kostet, somit dürfen 5 Centigramm nicht mit 25 Pf., sondern nur mit 20 Pf. berechnet werden.

III. Ueberschreitungen der Taxe werden auf Grund der Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 § 148 No. 8 bestraft.

Im sogenannten Handverkaufe bleibt die Preisbestimmung den Apothekern überlassen.

IV. Bei Berechnung der Recepte nach den Taxen **a**), **b**), **c**), **d**), **f**) und **g**) ist der aus dem Zusammenrechnen der einzelnen Taxansätze sich ergebende Taxpreis — wenn derselbe 1 Mk. nicht übersteigt — auf die Weise abzurunden, dass 1—4 Pf. auf 5 Pf. und 6—9 Pf. auf 10 Pf. erhöht werden. Wenn jedoch der Taxpreis des Receptes 1 Mk. übersteigt, so wird in der Weise abgerundet, dass z. B. 1 Mk. 1—4 Pf. auf 1 Mk. und 1 Mk. 6—9 Pf. auf 1 Mk. 5 Pf. herabzusetzen ist.

Bei Taxe **e**) wird stets nach oben abgerundet, auch bei den Recepten, welche mehr als 1 Mk. kosten.

Sehr wichtig ist bei diesem Paragraph über die Abrundung, die in den Taxen **a**) und **f**) enthaltene, in den anderen Taxen fehlende Bestimmung, dass bei dem Berechnen solcher Recepte, deren Kosten aus Staats- und Gemeindemitteln oder von Krankenkassen im Sinne des Krankenversicherungs-Gesetzes gezahlt werden, keinerlei Abrundung stattfinden darf.

Dagegen fehlt in den Taxen **a**) und **f**) die in den Taxen **b**), **c**), **d**) und **e**) vorhandene Bestimmung, dass bei

allen Arzneirechnungen für Staats- und Gemeindekosten, für öffentliche und milde Fonds usw. ein Abzug von 10 % gemacht wird.

Nach Taxe g) erhalten Ortskrankenkassen und öffentliche Anstalten 20 %, Armen- und Wohlthätigkeits-Anstalten 30 % Rabatt.

V. Auf dem Recepte fehlende, auf die Taxe Bezug habende Angaben muss der Apotheker ergänzen und auf dem Recepte bemerken.

VI. Bei allen in die Taxe nicht aufgenommenen Mitteln wird der Ein- und Verkaufspreis ähnlicher in der Taxe stehender Mittel bei der Berechnung zu Grunde gelegt und muss der Apotheker das preisbestimmende, zu Grunde gelegte Arzneimittel auf dem Recepte angeben.

VII. Im Falle in der Taxe von einem Arzneimittel mehrere Sorten angeführt sind, und der Arzt auf dem Recepte die zu verwendende Sorte nicht näher bezeichnet hat, so soll nach Taxe b) der Apotheker die theurere Sorte verwenden und berechnen, während er umgekehrt nach Taxe e) die wohlfeilere Sorte verwenden und berechnen soll. Verschreibt also ein Arzt ein Infus. fol. Sennae ohne nähere Bezeichnung, ob Alexandrin. oder Ostindic., so muss der bayerische Apotheker die theueren Alexandriner, der grossherzogl. hessische Apotheker dagegen die billigen ostindischen Sennesblätter verwenden und berechnen.

VIII. Der

## spezielle Theil,

welcher nunmehr in den Taxen folgt, enthält die Preise der Arzneimittel. Da diese sich häufiger ändern, so können solche nicht weiter besprochen werden. Es sei hier nur nochmals auf die bei Absatz II und VII im Vorstehenden gemachten Bemerkungen hingewiesen.

Ferner werden in der unten folgenden Anweisung zur Sparsamkeit auch einzelne Beispiele zur Ersparniss bei Verwendung einzelner Arzneimittel aufgeführt werden.

IX. Die

## Taxen für die Arbeiten des Apothekers und die Taxen für die verwendeten Gefässe,

welche hierauf folgen, sind von der grössten Bedeutung, umsomehr als gegen dieselben seitens der ordinirenden Aerzte am meisten gefehlt wird und über welche sich der Arzt deshalb am genauesten orientiren muss.

§ 6.

Wir bringen deshalb einen Auszug aus den Arzneitaxen mit den Preisen für Arbeiten und Gefässe und lassen im Anschluss daran eine Reihe von Erläuterungen und Beispielen folgen.

---

## Taxe für Gefässe.

| **Gläser,** runde, grüne oder halbweisse, einschliesslich Kork, Tectur und Signatur | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.10 |
| „ 15 „ „ „ | —.13 | —.— | —.— | —.— | —.10 | —.13 | —.— |
| „ 25 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.12 | —.— | —.— | —.— |
| „ 100 „ „ „ | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| „ 200 „ „ „ | —.20 | —.20 | —.— | —.— | —.20 | —.20 | —.20 |
| „ 300 „ „ „ | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| „ 400 „ „ „ | —.30 | —.30 | —.— | —.— | —.— | —.30 | —.30 |
| „ 500 „ „ „ | —.40 | —.35 | —.30 | —.30 | —.30 | —.40 | —.40 |
| jede weiteren 100 „ „ kost. mehr | —.— | —.05 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.05 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 300 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 500 „ „ „ | —.08 | —.— | —.— | —.10 | —.08 | —.08 | —.10 |

| **Gläser,** runde, gefärbte, einschliesslich Kork, Tectur und Signatur | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.15 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.15 |
| „ 15 „ „ „ | —.18 | —.— | —.— | —.— | —.15 | —.18 | —.— |
| „ 25 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.17 | —.— | —.— | —.— |
| „ 100 „ „ „ | —.23 | —.23 | —.15 | —.20 | —.23 | —.23 | —.20 |
| „ 200 „ „ „ | —.30 | —.30 | —.— | —.— | —.30 | —.30 | —.30 |
| „ 300 „ „ „ | —.38 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.38 | —.40 |
| „ 400 „ „ „ | —.45 | —.45 | —.— | —.— | —.— | —.45 | —.45 |
| „ 500 „ „ „ | —.53 | —.53 | —.35 | —.35 | —.45 | —.53 | —.50 |
| jede weiteren 100 „ „ kost. mehr | —.— | —.08 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.08 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 300 „ „ „ | —.13 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.13 | —.— |
| „ „ 500 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.15 | —.12 | —.— | —.15 |

| **Gläser,** sechseckige, grüne oder halbweisse, einschl. Kork, Tectur und Signatur | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.15 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.15 |
| „ 15 „ „ „ | —.15 | —.— | —.— | —.— | —.15 | —.15 | —.— |
| „ 25 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.15 | —.— | —.— | —.— |
| „ 100 „ „ „ | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| „ 200 „ „ „ | —.25 | —.30 | —.— | —.— | —.30 | —.25 | —.25 |
| „ 300 „ „ „ | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| „ 400 „ „ „ | —.40 | —.45 | —.— | —.— | —.— | —.40 | —.40 |
| „ 500 „ „ „ | —.50 | —.53 | —.35 | —.35 | —.45 | —.50 | —.50 |
| jede weiteren 100 „ „ kost. mehr | —.— | —.08 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 300 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 500 „ „ „ | —.15 | —.— | —.— | —.15 | —.12 | —.15 | —.15 |

| **Gläser,** sechseckige, gefärbte, einschliesslich Kork, Tectur und Signatur | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.15 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.20 |
| „ 15 „ „ „ | —.20 | —.— | —.— | —.— | —.15 | —.20 | —.— |
| „ 25 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.20 | —.— | —.— | —.— |
| „ 100 „ „ „ | —.25 | —.23 | —.15 | —.23 | —.23 | —.25 | —.25 |
| „ 200 „ „ „ | —.35 | —.30 | —.— | —.— | —.30 | —.35 | —.35 |
| „ 300 „ „ „ | —.45 | —.38 | —.25 | —.30 | —.38 | —.45 | —.45 |
| „ 400 „ „ „ | —.55 | —.45 | —.— | —.— | —.— | —.55 | —.55 |
| „ 500 „ „ „ | —.65 | —.53 | —.35 | —.40 | —.45 | —.65 | —.65 |
| jede weiteren 100 „ „ kost. mehr | —.— | —.08 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 300 „ „ „ | —.20 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.20 | —.— |
| „ „ 500 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.20 | —.12 | —.— | —.25 |

| **Kruken,** gelbe oder graue, mit Tectur und Signatur (olla grisea) | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ 50 „ „ „ | —.10 | —.15 | —.— | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| „ 100 „ „ „ | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| „ 200 „ „ „ | —.18 | —.45 | —.— | —.15 | —.13 | —.18 | —.20 |
| „ 300 „ „ „ | —.— | —.65 | —.20 | —.20 | —.— | —.— | —.— |
| „ 400 „ „ „ | —.25 | —.85 | —.— | —.— | —.— | —.25 | —.35 |
| „ 500 „ „ „ | —.30 | 1.05 | —.30 | —.30 | —.20 | —.30 | —.30 |
| jede weiteren 50 „ „ kost. mehr | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 500 „ „ „ | —.13 | —.— | —.— | —.10 | —.10 | —.13 | —.15 |

| **Kruken,** weisse, zu Augensalben (olla alba) | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.15 | —.15 | —.— | —.— | —.12 | —.15 | —.15 |
| „ 15 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.12 | —.— | —.— | —.— |
| „ 30 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.30 |
| „ 45 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.35 |
| „ 50 „ „ „ | —.23 | —.23 | —.— | —.15 | —.18 | —.23 | —.— |
| „ 60 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.40 |
| „ 100 „ „ „ | —.30 | —.38 | —.20 | —.20 | —.25 | —.30 | —.50 |

| **Pappschachteln,** runde oder ovale, ohne Falz, für ungetheilte Pulver (scatula ordinaria) | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 Gramm Inhalt einschl. | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ 20 „ „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.— |
| „ 30 „ „ „ | —.10 | —.— | —.— | —.08 | —.— | —.10 | —.15 |
| „ 50 „ „ „ | —.— | —.15 | —.10 | —.— | —.12 | —.— | —.— |
| „ 100 „ „ „ | —.15 | —.20 | —.— | —.12 | —.15 | —.15 | —.25 |
| „ 150 „ „ „ | —.— | —.— | —.15 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ 200 „ „ „ | —.25 | —.30 | —.— | —.18 | —.25 | —.25 | —.30 |
| „ 250 „ „ „ | —.— | —.— | —.20 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ 300 „ „ „ | —.30 | —.— | —.— | —.25 | —.— | —.30 | —.40 |
| „ 500 „ „ „ | —.40 | —.— | —.— | —.30 | —.— | —.40 | —.50 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pulverkästchen,** Pulverschieber, Convolutkästchen u. s. w. Die Verwendung und Berechnung derselben ist bei Lieferungen für Kassen unstatthaft. | | | | | | | |
| **Pulverconvolute** in Brieftaschenform | | | | | | | |
| bis zu 10 Pulvern . . . . . . | —.— | —.— | —.— | —.— | -.06 | —.— | —.— |
| für je weitere 10 Pulver . . . . | —.— | —.— | —.— | —.— | | —.— | —.— |
| Bemerkung. Da der in der Taxe e) für Anfertigen der dividirten Pulver ausgeworfene Arbeitslohn nur für die Division gilt, so kommen für die Dispensation der Pulver diese Brieftaschenconvolute in Ansatz. | | | | | | | |

## Taxe für Arbeiten.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abdampfen,** im Wasserbade, für jede 100 gr. oder weniger . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| **Auflösen** eines oder mehrerer Extrakte (mit Ausnahme der Extrakte von Sirupskonsistenz) . | *—.10 | *—.15 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | *—.10 | *—.15 |
| von Gummi arabicum . . . | *—.10 | *—.15 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | *—.10 | *—.15 |
| Zerreiben von Latwergen, Pulpen und weichen Seifen. . | *—.10 | *—.15 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | *—.10 | *—.15 |
| Anreiben von Pulvern, welche sich gar nicht oder nur zum Theile lösen . . . . . . | *—.10 | *—.15 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | *—.10 | *—.15 |
| Anfertigen von Mucilago Salep | —.10 | —.20 | —.30 | †—.25 | —.50 | —.10 | —.20 |
| Desgleichen von Mucilago Cydoniae, Traganth. . . . . | —.10 | —.20 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | —.10 | —.20 |
| Auflösen eines Oelzuckers, einschliesslich des Mischens desselben . . . . . . . | *—.20 | *—.30 | —.20 | *—.15 | —.30 bez. —.50 | *—.20 | *—.30 |

* Wenn mehrere der genannten Arbeiten zugleich vorkommen, so darf nur ein Arbeitslohn berechnet werden. Dagegen darf nach Taxe c) bei gleichzeitigem Vorkommen von mehreren der genannten Arbeiten auch der mehrfache Arbeitspreis, jedoch nicht mehr als zusammen 40 Pf. berechnet werden. † Arbeitslohn ist einschliesslich des Wassers, der Wägung desselben und der Colatur für 100,0, für jede weiteren 100,0 je 5 Pf. mehr.

**Auflösen** eines od. mehrerer Salze, des Zuckers, anderer krystallisirter Substanzen, der Manna,

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einschliesslich des Colirens und Filtrirens . . . . . . . . | *—.15 | *—.15 | *—.20 | *—.15 | *-.30 bez. —.50 | *—.15 | *—.15 |
| * Das gleichzeitige Auflösen von mehreren der angeführten Substanzen darf nur einmal berechnet werden. | | | | | | | |
| Bemerkung 1. Bei gleichzeitiger Verordnung einer Auflösung von Extrakten oder Anreibung von Pulvern und Auflösung von Salzen werden nach den Taxen **a)**, **b)**, **c)** und **f)** beide Arbeitspreise [**Taxe b)** Gummi ausgenommen] berechnet; bei Taxe **c)** jedoch nicht mehr als zusammen 40 Pf. | | | | | | | |
| Bemerkung 2. Bei den Taxen **a)**, **b)**, **d)**, **f)** und **g)** tritt zu den angeführten Arbeitspreisen noch der Arbeitslohn von 3 Pf. bezw. bei **g)** von 5 Pf. für das Abwägen jedes einzelnen in die Arznei eintretenden Arzneimittels, bei Taxe **c)** wird hierfür der Pauschalbetrag von 20 Pf. als Grundtaxe zugerechnet. In den Arbeitspreisen der Taxe **e)** sind die Arbeitslöhne für das Abwägen, sowie in den höheren auch gleichzeitig die Arbeitspreise für die Bereitung von Dekokten, Infusionen u.s.w., einschliesslich des verbrauchten destillirten Wassers, enthalten. | | | | | | | |
| **Auflösen** von Phosphor in Aether, Alkohol, in ätherischen oder fetten Oelen u. s. w. . . . . | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.30 | —.25 | —.15 |
| Bemerkung 3. Wegen der hinzutretenden Arbeitslöhne für das Wägen siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Comprimiren** (käufliche Tabletten ausgenommen) | | | | | | | |
| bis einschl. 10 St., jed. St. | } —.10 | | | | | } —.10 | —.10 |
| „ „ 25 „ „ „ | | } —.10 | } —.05 | } —.06 | } —.10 | | } —.05 |
| darüber hinaus „ „ | —.05 | | | | | —.05 | |
| Bemerkung 4. Siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Contundiren** einer Substanz | | | | | | | |
| bis 20 gr. einschl. . . | —.05 | | | | | —.05 | |
| „ 50 „ „ . . | —.10 | } —.15 | | } —.05 | | —.10 | |
| „ 100 „ „ . . | —.15 | | } *-.20 | | } —.10 | —.15 | } °-.15 |
| „ 200 „ „ . . | —.20 | } —.25 | | } —.10 | | —.20 | |
| „ 500 „ „ . . | —.25 | | | | | —.25 | |

* In der Grundtaxe von 20 Pf. bereits enthalten. ° Für das Contundiren einer oder mehrerer Substanzen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dekokta** und **Infusa**<br>bis zu 100 gr. einschl. .<br>über 100 gr. jede 100 gr. | <br>}—.25 | <br>}—.30 | <br>}—.30 | <br>—.25<br>—.05 | <br>}—.50 | <br>}—.25 | <br>}—.25 |
| Bemerkung 5. In den aufgeführten Preisen ist mit Ausnahme von Taxe g), welche das verwendete destillirte Wasser berechnen lässt, der Preis für das verwendete destillirte Wasser, die Wägung desselben und die Kolatur einbegriffen. | | | | | | | |
| Betreffs der sonstigen Arbeitslöhne u. s. w. siehe oben Bemerkung 2. Nach Taxe c) ist hierbei zu beachten, dass bei gleichzeitigem Vorkommen von Auflösungen, Zerreibungen u. s. w. und Dekokten oder Infusen u. s. w. zusammen ausser der Grundtaxe von 20 Pf. nur 40 Pf. [nicht 20 + 30 = 50 Pf.] berechnet werden dürfen. | | | | | | | |
| Bei Taxe e) darf der Arbeitspreis von 50 Pf. überhaupt nur einmal berechnet werden. | | | | | | | |
| **Digestionen;** für die ersten 24 Stunden . . . . . . . . . | †—.25 | †—.25 | —.30 | †—.25 | —.50 | †—.25 | †—.25 |
| † Jede weiteren angefangenen 24 Stunden die Hälfte mehr. | | | | | | | |
| Bemerkung 6. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Dispensation** eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. von Species, von einzelnen Pulvern, einschl. des Abwägens, Papierbeutels und der Signatur<br>bis 100 gr. einschl. . .<br>„ 200 „ „ . .<br>für grössere Mengen . | <br>—.07<br>—.10<br>—.14 | <br><br>}—.15 | <br><br>}—.10 | <br>—.08<br>}—.10 | <br><br>}—.10 | <br>—.07<br>—.10<br>—.14 | <br><br>}—.10 |
| **Dispensation** eines nicht gestrichenen Pflasters, einer Salbenmenge, eines Suppositoriums u. s. w.<br>bis 10 gr. einschl. . .<br>„ 100 „ „ . .<br>„ 200 „ „ . .<br>für grössere Mengen . | <br>—.07<br>—.10<br>—.14<br>—.20 | <br><br>}—.15 | <br><br>}—.10 | <br>*—.05<br>}—.10 | <br><br>}—.10 | <br>—.07<br>—.10<br>—.14<br>—.20 | <br><br>}—.10 |
| * Bis 20 gr. einschliesslich. | | | | | | | |
| **Dispensation** eines gestrichenen Pflasters<br>bis 50 qcm. . . . . . .<br>grössere Pflaster . . . | <br>}° -.10 | <br>}—.15 | <br>}—.10 | <br>—.06<br>—.10 | <br>}—.10 | <br>}° -.10 | <br>}—.10 |
| ° Das verwendete Wachspapier wird besonders berechnet. | | | | | | | |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Emulsionen,** Samen-, ausschliesslich [* Taxe **b**) einschliesslich] des verwendeten Wassers, einschliesslich der Wägung desselben und der Kolatur . . . | —.25 | *—.25 | —.20 | —.25 | —.50 | —.25 | —.25 |
| **Emulsionen,** Oel-, Balsam-, Gummiharz-, Harz-, Kamphor- oder Wachs-, ausschliesslich des verwendeten Wassers, einschliesslich der Wägung desselben und der Kolatur . . . . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.25 | —.50 | —.25 | —.25 |
| Bemerkung 7. Wegen der weiteren Arbeitslöhne bei beiden Arten von Emulsionen siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Filtrationen,** wenn unumgänglich nöthig oder vom Arzte vorgeschrieben | | | | | | | |
| bis 100 gr. einschl. . . | —.05 | —.10 | —.20 | —.10 | —.05 | —.05 | —.10 |
| „ 200 „ „ . . | | | | | —.08 | | |
| „ 500 „ „ . . | —.10 | | | | —.10 | —.10 | |
| **Gelatinen** aus Carraghen, isländischem Moos, Hirschhorn, Hausenblase u. s. w. | | | | | | | |
| bis 200 gr. einschl. . . | —.50 | —.— | —.30 | —.40 | —.50 | —.50 | —.50 |
| jede weiteren 100 gr. od. weniger . . . . . | | | | —.10 | | | |
| Bemerkung 8. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Latwergen** . . . . . . . . . . | —.15 | —.20 | —.20 | —.20 | —.30 | —.15 | —.30 |
| Bemerkung 9. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Macerationen,** bis zu 24 Stunden | —.15 | —.— | —.30 | —.— | —.50 | —.15 | —.20 |
| Bemerkung 10. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Pflaster,** bereitet durch Mischen und Malaxiren | | | | | | | |
| bis 100 gr. einschl. . . | —.15 | —.20 | —.20 | —.20 | —.30 | —.15 | —.20 |
| „ 200 „ „ . . | —.20 | | | —.25 | —.40 | —.20 | |
| grössere Mengen ohne Rücksicht auf das Mehrgewicht . . . . | —.30 | | | —.30 | —.— | —.30 | |
| jede weitere 100 gr. mehr | —.— | | | —.— | —.10 | —.— | |
| Bemerkung 11. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pflaster,** bereitet durch Schmelzen und Kochen, einschl. Mischen und Malaxiren | | | | | | | |
| bis 100 gr. einschl. . . | —.20 | } | } | —.30 | —.30 | —.20 | } |
| „ 200 „ „ . . | —.40 | } | } | —.40 | —.40 | —.40 | } |
| grössere Mengen ohne Rücksicht auf das Mehrgewicht . . . . | —.60 | }—.20 | }—.30 | —.60 | —.— | —.60 | }—.20 |
| jede weitere 100 gr. mehr | —.— | } | } | —.— | —.10 | —.— | } |
| Bemerkung 12. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Pflaster,** für das Streichen | | | | | | | |
| bis zu 50 qcm. . . . | —.10 | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.10 | —.— |
| „ „ 100 „ . . . | —.— | —.20 | —.30 | —.— | * —.25 | —.— | —.20 |
| jede weitere 10 qcm. mehr | —.01 | —.— | —.— | —.01 | —.— | —.01 | —.— |
| „ „ 20 „ „ | —.— | —.— | —.01 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 25 „ „ | —.— | —.— | —.— | —.— | * —.05 | —.— | —.— |
| „ „ 100 „ „ | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.10 |
| Das zu verwendende Leinen oder Shirting . je 100 qcm. | —.10 | —.05 | —.05 | —.05 | —.— | —.10 | —.10 |
| Das zu verwendende Leder je 100 qcm. | —.15 | —.10 | —.10 | —.16 | —.— | —.15 | —.20 |
| * Einschliesslich Leinewand, Leder oder Seidenzeug. | | | | | | | |
| **Pillen,** Boli, Trochisci. | | | | | | | |
| Bereitung der Masse | | | | | | | |
| bis 20 gr. einschl. . . | —.10 | } | } | —.— | } | —.10 | } |
| „ 30 „ „ . . | —.— | } | } | —.20 | } | —.— | } |
| jede weiteren 10 gr. mehr | —.03 | } | }—.20 | —.03 | } | —.03 | } |
| Für das Zusammenschmelzen | | } | } | | } | | }* -.30 |
| von Wachs besonders . . | —.10 | }—.30 | } | —.10 | }* -.35 | —.10 | —.10 |
| Formiren, einschl. Bestreuen mit Lycopodium od. Pulvern von gleichem Preise | | } | | | } | | } |
| unter und bis zu 30 Pillen | —.10 | } | —.10 | —.10 | } | —.10 | } |
| für und bis zu je weiteren 30 Pillen . . . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | * —.10 | —.10 | * —.10 |
| * Preise beziehen sich auf je 25 Pillen. | | | | | | | |
| Bemerkung 13. Wegen der weiteren Arbeitslöhne bezw. Grundtaxe siehe Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Pulver.** Mengen eines feinen Pulvers bis 100 gr. einschl. . . . | —.10 | }—.15 | }—.20 | —.10 | }—.20 | —.10 | }—.15 |
| grössere Mengen . . . | —.15 | } | } | —.15 | } | —.15 | } |

Bemerkung 14. Bei den Taxen **a**), **b**), **d**), **f**) und **g**) kommt noch der Arbeitslohn von 3 Pf. bezw. bei **g**) von 5 Pf. für das Abwägen eines jeden einzelnen in das Pulver eingehenden Arzneimittels hierzu, bei

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| den Taxen c) und e ist der Arbeitslohn für das Abwägen in den aufgeführten Arbeitspreisen schon enthalten. | | | | | | | |
| Abtheilen (Dividiren) der Pulver, einschl. der Kapsel, des Papierbeutels und der Signatur . . . . . das Stück | —.05 | —.— | —.04 | —.04 | —.03 | —.05 | —.05 |
| bei Wachskapseln, jedoch nur, wenn solche unumgänglich nöthig oder vom Arzte verordnet sind . . . . . . | —.06 | —.— | —.05 | —.04 | —.04 | —.06 | —.06 |
| Die ersten 2 bis 5 abgetheilten Pulver, einschliesslich des event. nöthigen Mischens . | —.— | —.30 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| bei Wachskapseln . . . . . | —.— | —.36 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| für und bis je weitere 5 Stück | —.— | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| bei Wachskapseln . . . . . | —.— | —.12 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| Bemerkung 15. Im Falle nur eine einzelne Substanz in einzelne Dosen abgetheilt werden soll, darf für das Abwägen der Gesammtmenge dieses einzelnen Arzneimittels und event. Zerreiben desselben nichts berechnet werden; nur Taxe c) erlaubt 10 Pf. Grundtaxe; soll dagegen ein gemischtes feines Pulver abgetheilt werden, so tritt noch bei den Taxen a), b), d), f) und g) der Arbeitslohn für das Wägen eines jeden in das Gemisch eingehenden Arzneimittels mit je 3 Pf. bezw. bei g) mit je 5 Pf., sowie bei den Taxen a), c), d), f) und g) noch der oben angegebene Arbeitslohn für das Mengen eines feinen Pulvers mit 10 Pf. bezw. 15 Pf. bezw. 20 Pf. hinzu. | | | | | | | |
| **Species.** Mischen bis 100 gr. einschl. | —.15 | | | —.05 | | —.05 | |
| „ 200 „ „ | —.07 | —.15 | —.20 | —.10 | —.20 | —.07 | —.10 |
| grössere Mengen | —.10 | | | | | —.10 | |
| Bemerkung 16. Wegen der weiteren Arbeitslöhne siehe Bemerkung 14. | | | | | | | |
| Abtheilen grober Pulver oder Species | | | | | | | |
| bis 100 gr. Gewicht des einzelnen Packetes | —.05 | | | —.04 | | —.05 | |
| bis 200 gr. Gewicht des einzelnen Packetes | —.08 | —.05 | —.05 | —.05 | —.03 | —.08 | —.05 |
| bei grösserem Gewichte | —.10 | | | | | —.10 | |
| Bemerkung 17. Es gelten für das Abwägen u. s. w. die Erläuterungen der Bemerkung 15. | | | | | | | |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Salben.** Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben oder Fette, oder von Salben und Fetten mit flüssigen Substanzen ohne Schmelzen | | | | | | | |
| bis 50 gr. einschl. . . | —.10 | | | —.10 | | —.10 | |
| „ 100 „ „ . . | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | —.20 | —.15 | —.25 |
| „ 200 „ „ . . | —.25 | | | —.25 | | —.25 | |
| für grössere Mengen . | —.30 | | | —.30 | | —.30 | |
| **Salben.** Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extrakten, Salzen u. dergl. mit Salhen oder Fetten ohne Schmelzen bereitet | | | | | | | |
| bis 50 gr. einschl. . . | —.15 | | | —.15 | | —.15 | |
| „ 100 „ „ . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| „ 200 „ „ . . | —.40 | | | —.40 | | —.40 | |
| für grössere Mengen . | —.50 | | | —.50 | | —.50 | |
| **Salben.** Bereitung einer Salbe durch Schmelzen einschl. Zumischen anderer Substanzen und Agitiren | | | | | | | |
| bis 50 gr. einschl. . . | —.25 | | | —.20 | | —.25 | |
| „ 100 „ „ . . | —.40 | —.25 | —.30 | —.30 | —.40 | —.40 | —.25 |
| „ 200 „ „ . . | —.60 | | | —.40 | | —.60 | |
| Bemerkung 18. Bei den drei verschiedenen Arten von Salben tritt zu den angeführten Arbeitspreisen noch der Arbeitslohn für das Abwägen eines jeden in die Salbe eingehenden Arzneimittels mit 3 Pf. bei den Taxen **a**), **b**), **d**) und **f**) bezw. von 5 Pf. bei Taxe **g**), während bei Taxe **c**) der Pauschalbetrag von 20 Pf. als Grundtaxe hinzukommt; bei Taxe **e**) darf weder Wägung noch Grundtaxe berechnet werden. | | | | | | | |
| **Saturationen,** *aus- bezw. °einschliesslich des Lösens der zu sättigenden Substanzen . . . | *—.20 | °—.20 | —.20 | °—.25 | —.50 | *—.20 | *—.20 |
| Bemerkung 19. Wegen der Arbeitslöhne für das Abwägen u.s.w. siehe oben Bemerkung 2. | | | | | | | |
| **Suppositoria,** Bereitung, einschl. der Herstellung der Masse | | | | | | | |
| das erste Stück . . . | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.25 | —.10 | —.10 |
| jedes weitere Stück . . | —.05 | —.— | —.— | —.— | —.10 | —.05 | —.10 |
| Herstellung der Masse . . . | —.— | —.20 | —.20 | —.20 | —.— | —.— | —.— |
| Bereitung jed. einzeln. Stückes | —.— | —.05 | —.05 | —.05 | —.— | —.— | —.— |
| Bemerkung 20. Wegen der Arbeitslöhne für Wägungen u. s. w. siehe oben Bemerkung 18. | | | | | | | |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wägung,** Abzählung fertiger Pillen, Tropfenzählung . . . . . . | —.03 | —.03 | —.10 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Bemerkung 21. Bei den Taxen c) und e) darf obiger Arbeitslohn für das Wägen nur in Ansatz kommen, wenn die Wägung oder Abzählung nicht schon in der Grundtaxe oder in den anderen Arbeitspreisen enthalten ist. | | | | | | | |

---

## 1. Anweisung zur Sparsamkeit.

§ 7.

Zur Dispensation flüssiger Arzneien genügt gewöhnliches grünes oder halbweisses Glas. Es schreibe daher der Arzt auf seinen Ordinationen: „Detur ad vitrum viride“ oder „D. in vitro viride.“

Nur bei einzelnen Arzneimitteln, welche durch die Einwirkung des Lichtes zersetzt werden, ist die Verwendung gefärbter Gläser (Vitrum nigrum oder fuscum oder coloratum) angezeigt.

Es sind dies hauptsächlich:

Aether*)
„ bromatus
Amylenum hydratum
Amylium nitrosum
Argentum nitricum
Aqua Chlori
Apomorphinum hydrochloricum
Chloroformium*)
Jodoformium
Naphtolum
Paraldehydum
Pyrogallolum
Thallinum sulfuricum.

Die Taxe b) enthält die sehr weitgehende Bestimmung, dass alle Arzneimittel, welche nach dem Deutschen Arzneibuche vor dem Lichte geschützt aufbewahrt werden müssen, auch nur in gefärbten Gläsern dispensirt werden sollen. Infolge dieser Taxbestimmung muss der bayerische Apotheker Mixturen mit Chinin. sulfuric. in

*) Aether, Aethermischungen, Chloroform und Chloroform-Mischungen zu Einreibungen können „in vitro viride“ dispensirt werden.

gefärbten Gläsern abgeben, während er Mixturen mit Chinin. hydrochloric. in grünem Glase abgeben darf.

§ 8.

Der Arzt achte auf das Genaueste darauf, dass der Inhalt der Flaschen die Taxgrenzen von 15 Gramm [Taxe b) schon 10 Gramm], [Taxe d) erst von 25 Gramm], [Taxe c) erst von 100 Gramm], 100, 200, [bei Taxen c) und d) liegen die Gefässgrenzen bei 100 Gramm und 300 Gramm], 300, 400, 500 Gramm Inhalt nicht überschreitet.

Findet eine Ueberschreitung der angegebenen Grenzen um die geringste Gewichtsgrösse, selbst nur um ein Hundertstel Milligramm statt, so wird der nächst höhere Preis des Gefässes berechnet.

Eine Ueberschreitung der Grenzen des Inhaltes der Gläser ist um so mehr zu vermeiden, als die Preise der durch Beschluss des Bundesrathes vom 2. Juli 1891 für äusserliche Arzneien vorgeschriebenen 6eckigen Gläser höher sind, als die Preise der sonst gebräuchlichen runden, grünen oder halbweissen Gläser.

---

# Beispiele:

## A. Flüssige Arzneien zum innerlichen Gebrauche.

### Runde Gläser.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Tincturae Chinae composit. 15,0 gr. | —.30 | —.30 | —.23 | —.23 | —.23 | —.30 | —.30 |
| Tincturae Aconiti . . . 1,0 „ | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. D. S. Alle 3 Stunden 15 Tropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 | —.06 | —.10 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.54 | * —.56 | ° —.56 | † —.46 | —.51 | —.54 | * —.60 |
| abgerundet . . . . | —.54 | —.60 | —.60 | —.50 | —.55 | —.54 | —.60 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Tincturae Aconiti . . . 1,0 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Tincturae Chinae composit. 14,0 „ | —.28 | —.28 | —.21 | —.21 | —.21 | —.28 | —.28 |
| M. D. S. Alle 3 Stunden 15 Tropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 | —.06 | —.10 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.13 | —.15 | —.10 | —.12 | —.10 | —.13 | —.15 |
| | —.50 | * —.54 | ° —.54 | † —.44 | —.44 | —.50 | * —.58 |
| abgerundet . . . . | —.50 | —.55 | —.55 | —.45 | —.45 | —.50 | —.60 |
| **Ersparniss** in % ca. | 8 | 8¼ | 8¼ | 10 | 18 | 8 | — |

* Gefässgrenze liegt schon bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 100,0.
† Gefässgrenze liegt erst bei 25,0.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,06 gr. | —.03 | —.06 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Aquae Amygdalarum am. 15,0 „ | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 |
| M. D. S. Tropfenweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.15 | ** -.23 | —.10 | —.12 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.62 | * —.73 | ° —.76 | † —.61 | —.74 | —.62 | * —.68 |
| abgerundet . . . . | —.62 | —.75 | —.80 | —.65 | —.75 | —.62 | —.70 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,06 gr. | —.03 | —.06 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Aquae Amygdalarum am. **ad** 15,0 „ | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 |
| M. D. S. Tropfenweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.13 | ** -.23 | —.10 | —.12 | —.10 | —.13 | —.15 |
| | —.60 | * —.73 | ° —.76 | † —.61 | —.69 | —.60 | * —.68 |
| abgerundet . . . . | —.60 | —.75 | —.80 | —.65 | —.70 | —.60 | —.70 |
| **Ersparniss** in % ca. | **3** | — | — | — | **6½** | **3** | — |

* Gefässgrenze liegt schon bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 100,0.
† Gefässgrenze liegt erst bei 25,0. ** Schwarzes Glas.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Phosphori . . . . . 0,01 gr. | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 | —.10 | —.03 | —.05 |
| Olei Jecoris Aselli citrini 100,0 „ | —.35 | —.40 | —.40 | —.25 | —.30 | —.35 | —.35 |
| M. D. S. Nach Bericht. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Phosphorlösung . . . . | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | | —.25 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | * —.30 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.89 | 1.01 | 1.10 | —.86 | —.90 | —.89 | —.85 |
| abgerundet . . . . | —.89 | 1.— | 1.10 | —.90 | —.90 | —.89 | —.85 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Phosphori . . . . . 0,01 gr. | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 | —.10 | —.03 | —.05 |
| Olei Jecoris Aselli q. s. **ad** 100,0 „ | —.35 | —.40 | —.40 | —.25 | —.30 | —.35 | —.35 |
| M. D. S. Nach Bericht. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Phosphorlösung . . . . | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | | —.25 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.15 | * —.23 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.84 | —.94 | 1.— | —.81 | —.85 | —.84 | —.80 |
| abgerundet . . . . | —.84 | —.95 | 1.— | —.85 | —.85 | —.84 | —.80 |
| **Ersparniss** in % ca. | **5¾** | **5** | **9** | **5½** | **5½** | **5¾** | **6¼** |

* Schwarzes Glas.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Infusi Ipecacuanhae 0,5 : 180,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Natrii bicarbonici . . . 2,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirupi simplicis . . . . 20,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | Aq. —.09 |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | } —.20 | —.09 | } —.50 | —.09 | —.15 |
| 1 Infusum . . . . . . . | —.25 | —.30 | | —.30 | | —.25 | —.25 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | —.40 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| | —.92 | —.97 | * —.98 | * —.92 | —.93 | —,92 | 1.09 |
| abgerundet . . . . | —.92 | 1.— | 1.— | —.95 | —.95 | —.92 | 1.05 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Infusi Ipecacuanhae 0,5 : 180,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Natrii bicarbonici . . . 2,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirupi simplicis q. s. **ad** 200,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | Aq. —.09 |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | } —.20 | —.09 | } —.50 | —.09 | —.15 |
| 1 Infusum . . . . . . . | —.25 | —.30 | | —.30 | | —.25 | —.25 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | —.40 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.86 | —.91 | * —.97 | * —.91 | —.87 | —.86 | 1.03 |
| abgerundet . . . . | —.86 | —.95 | 1.— | —.95 | —.90 | —.86 | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | **6½** | **5** | — | — | **5¼** | **6½** | **5** |

* Gefässgrenzen liegen bei 100,0 bezw. 300,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi hydrochlorici . . . 2,5 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae . . 178,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| Sirupi simplicis . . . 20.0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündl. 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.10 | —.09 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| | —.56 | —.58 | * —.62 | * —.53 | —.57 | —.56 | —.64 |
| abgerundet . . . . | —.56 | —.60 | —.65 | —.55 | —.60 | —.56 | —.65 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi hydrochlorici diluti 5,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirupi simplicis . . . . 20,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 200,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zweistündl. 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.10 | —.09 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.51 | —.51 | * —.62 | * —.51 | —.52 | —.51 | —.59 |
| abgerundet . . . . | —.51 | —.55 | —.65 | —.55 | —.55 | —.51 | —.60 |
| **Ersparniss** in % ca. | **10** | **8¼** | — | — | **8¼** | **10** | **8¼** |

* Gefässgrenzen liegen bei 100,0 bezw. 300,0.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Apomorphini hydrochlorici 0,04 gr. | —.20 | —.20 | —.20 | —.16 | —.32 | —.20 | —.20 |
| Morphii hydrochlorici . . 0,02 " | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae . . 180,0 " | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| Sirupi simplicis . . . . 20,0 " | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. "Zweistündl. 1 Esslöffel." | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | }—.30 | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | } | —.15 | —.15 |
| 1 braunes Glas . . . . . | —.38 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.38 | —.40 |
| | 1.07 | 1.29 | *1.07 | *—.92 | 1.22 | 1.07 | 1.19 |
| abgerundet . . . . | 1.07 | 1.25 | 1.05 | —.95 | 1.25 | 1.07 | 1.15 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Apomorphini hydrochlorici 0,04 gr. | —.20 | —.40 | —.20 | —.16 | —.32 | —.20 | —.20 |
| Morphii hydrochlorici . . 0,02 " | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirupi simplicis . . . 20,0 " | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 200,0 " | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. "Zweistündl. 1 Esslöffel." | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | }—.30 | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | } | —.15 | —.15 |
| 1 braunes Glas . . . . . | —.30 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.30 | —.30 |
| | —.99 | 1.21 | *1.07 | *—.92 | 1.14 | —.99 | 1.09 |
| abgerundet . . . . | —.99 | 1.20 | 1.05 | —.95 | 1.15 | —.99 | 1.05 |
| **Ersparniss** in °/₀ ca. | **8** | **4** | — | — | **8** | **8** | **8¾** |

* Gefässgrenzen liegen bei 100,0 bezw. 300,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,06 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Mixturae solventis . . 200,0 " | | | | | | | |
| (Amon. chlorati . . 5,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Succ. Liquirit. . . . 2,0 " | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Aq. destillat. ad . 200,0 " ) | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündl. 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | }—.30 | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | } | }—.15 | } | —.15 | }—.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | —.20 | } | } | —.10 | } |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| | —.88 | —.95 | *—.82 | *—.68 | —.79 | —.88 | —.90 |
| abgerundet . . . . | —.88 | —.95 | —.85 | —.70 | —.80 | —.88 | —.90 |

| sondern der Arzt **muss** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,06 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Mixturae solventis q. s. **ad** 200,0 „ | | | | | | | |
| | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | } —.20 (4 Wägungen + 1 Salzlösung) | —.12 | } —.30 (4 Wägungen + 1 Salzlösung + 1 Extraktlösung) | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | | } —.15 (1 Salzlösung + 1 Extraktlösung) | | —.15 | } —.15 (1 Salzlösung + 1 Extraktlösung) |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | —.20 | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.83 | —.90 | * —.82 | * —.68 | —.74 | —.83 | 85.— |
| abgerundet . . . . | —.83 | —.90 | —.85 | —.70 | —.75 | —.83 | 85.— |
| **Ersparniss** in % ca. | 5¾ | 5¼ | — | — | 6¼ | 5¼ | 5 |

* Gefässgrenzen liegen bei 100,0 bezw. 300,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati . . . . . 2,5 gr. | —.04 | —.04 | —.03 | —.03 | —.08 | —.04 | —.05 |
| Aquae destillatae . . . 90,0 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Sirupi Aurantii Corticis . 10,0 „ | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.18 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Dreimal täglich 1 Theelöffel voll. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | } —.30 (3 Wägungen + 1 Salzlösung) | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.68 | —.68 | —.78 | —.64 | —.75 | —.68 | —.75 |
| abgerundet . . . . | —.68 | —.70 | —.80 | —.65 | —.75 | —.68 | —.75 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati . . . . . 2,5 gr. | —.04 | —.04 | —.03 | —.03 | —.08 | —.04 | —.05 |
| Sirupi Aurantii Corticis . 10,0 „ | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.15 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 100,0 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. D. S. Dreimal täglich 1 Theelöffel voll. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | } —.30 (3 Wägungen + 1 Salzlösung) | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.63 | —.63 | —.68 | —.59 | —.70 | —.63 | —.70 |
| abgerundet . . . . | —.63 | —.65 | —.70 | —.60 | —.70 | —.63 | —.70 |
| **Ersparniss** in % ca. | 7¼ | 7 | 12½ | 7¾ | 6¾ | 7¼ | 6¾ |

(Wegen fernerer Ersparniss bei Sirupus Aurantii Cort. siehe hinten.)

---

## B. Flüssige Arzneien zum äusserlichen Gebrauche.

### Sechseckige Gläser.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Atropini sulfurici . . . 0,05 gr. | —.10 | —.25 | —.10 | —.10 | —.25 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae . . 15,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. D. S. Augentropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.20 | —.23 | —.15 | —.15 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | —.54 | *—.72 | °—.68 | †—.49 | —.81 | —.54 | *—.60 |
| abgerundet . . . . | —.54 | —.75 | —.70 | —.50 | —.85 | —.54 | —.60 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Atropini sulfurici . . . 0,05 gr. | —.10 | —.25 | —.10 | —.10 | —.25 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 15,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. D. S. Augentropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.15 | —.23 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 |
| | —.49 | *—.72 | °—.68 | †—.49 | —.73 | —.49 | *—.30 |
| abgerundet . . . . | —.49 | —.75 | —.70 | —.50 | —.75 | —.49 | —.60 |
| **Ersparniss** in % ca. | **9¼** | — | — | — | **11¾** | **9¼** | — |

* Gefässgrenze liegt schon bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 100.0.
† Gefässgrenze liegt bei 25,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Argenti nitrici . . . . 0.5 gr. | —.20 | —.25 | —.25 | —.20 | —.25 | —.20 | —.20 |
| Aquae destillatae . . . 15,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges dunkles Glas . | —.25 | —.23 | —.15 | —.20 | —.23 | —.25 | —.25 |
| | —.69 | *—.72 | °—.83 | †—.64 | —.81 | —.69 | *—.75 |
| abgerundet . . . . | —.69 | —.75 | —.85 | —.65 | —.85 | —.69 | —.75 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Argenti nitrici . . . . 0,5 gr. | —.20 | —.25 | —.25 | —.20 | —.25 | —.20 | —.20 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 15,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges dunkles Glas . | —.20 | —.23 | —.15 | —.20 | —.15 | —.20 | —.25 |
| | —.64 | *—.72 | °—.83 | †—.64 | —.73 | —.64 | *—.75 |
| abgerundet . . . . | —.64 | —.75 | —.85 | —.65 | —.75 | —.64 | —.75 |
| **Ersparniss** in % ca. | **7¼** | — | — | — | **11¼** | **7¼** | — |

* Gefässgrenze liegt schon bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 100,0.
† Gefässgrenze liegt bei 25,0.

---

Der Arzt darf **nicht** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Cupri sulfurici . . . . 5,0 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae . . 300,0 „ | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.40 | —.45 | —.35 | —.35 | —.45 | —.40 | —.40 |
| | —.79 | —.86 | —.93 | —.76 | —.93 | —.79 | —.85 |
| abgerundet . . . . | —.79 | —.90 | —.95 | —.80 | —.95 | —.79 | —.85 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Cupri sulfurici . . . . 5,0 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 300,0 „ | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | —.74 | —.79 | —.83 | —.66 | —.86 | —.74 | —.80 |
| abgerundet . . . . | —.74 | —.80 | —.85 | —.70 | —.90 | —.74 | —.80 |
| **Ersparniss** in % ca. | **6¼** | **11** | **10½** | **12½** | **5¼** | **6¼** | **6** |

---

Der Arzt darf **nicht** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Aquae Menthae pip. . 300,0 „ | —.75 | —.60 | —.60 | —.60 | —.45 | —.75 | —.75 |
| M. D. S. Gurgelwasser. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Auflösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.40 | —.45 | —.35 | —.35 | —.45 | —.40 | —.40 |
| | 1.41 | 1.31 | 1.40 | 1.21 | 1.25 | 1.41 | 1.45 |
| abgerundet . . . . | 1.41 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.25 | 1.41 | 1.45 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Aquae Menthae pip. q.s. **ad** 300,0 „ | —.75 | —.60 | —.60 | —.60 | —.45 | —.75 | —.75 |
| M. D. S. Gurgelwasser. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Auflösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | 1.36 | 1.24 | 1.30 | 1.11 | 1.18 | 1.36 | 1.40 |
| abgerundet . . . . | 1.36 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.36 | 1.40 |
| **Ersparniss** in % ca. | **3½** | **7¾** | **7¼** | **8¼** | **4** | **3½** | **3½** |

(Wegen weiterer Ersparnisse bei diesen Ordinationen siehe bei den aromatischen Wässern.)

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,5 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae . . 500,0 „ | —.25 | —.25 | —.20 | —.15 | —.25 | —.25 | —.25 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas. . | —.65 | —.60 | —.40 | —.50 | —.57 | —.65 | —.65 |
| | 1.14 | 1.11 | 1.03 | —.91 | 1.15 | 1.14 | 1.20 |
| abgerundet . . . . | 1.14 | 1.10 | 1.— | —.95 | 1.15 | 1.14 | 1.20 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,5 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 500,0 „ | —.25 | —.25 | —.20 | —.15 | —.25 | —.25 | —.25 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas. . | —.50 | —.53 | —.35 | —.35 | —.45 | —.50 | —.50 |
| | —.99 | 1.04 | —.98 | —.76 | 1.03 | —.99 | 1.05 |
| abgerundet . . . . | —.99 | 1.— | 1.— | —.75 | 1.05 | —.99 | 1.05 |
| **Ersparniss** in % ca. | **13** | **9** | *— | **21** | **9** | **13** | **12½** |

* Die Ersparniss geht durch die Aufrundung wieder verloren.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlor. . . 0,2 gr. | —.10 | —.12 | —.10 | —.16 | —.20 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae . . 200,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zum Inhaliren. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | —.76 | —.81 | *—.85 | *—.72 | —.98 | —.76 | —.80 |
| abgerundet . . . . | —.76 | —.85 | —.85 | —.75 | 1.— | —.76 | —.80 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlor. . . 0,2 gr. | —.10 | —.12 | —.10 | —.16 | —.20 | —.10 | —.10 |
| Aquae destillatae **ad** . 200,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zum Inhaliren. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| | —.66 | —.73 | *—.85 | *—.72 | —.90 | —.66 | —.70 |
| abgerundet . . . . | —.66 | —.75 | —.85 | —.75 | —.90 | —.66 | —.70 |
| **Ersparniss** in % ca. | **13¼** | **11¾** | — | — | **10** | **13¼** | **12½** |

* Gefässgrenzen liegen bei 100,0 bezw. 300,0.

## C. Salben.

### Töpfe.

§ 9.

Bei Ordination von Salben verordne der Arzt stets: „Detur ad ollam griseam“ oder „D. in olla grisea.“ Ausgenommen sind nur die Augensalben, welche „ad ollam albam“ dispensirt werden.

Bei der Ordination der Salben achte der Arzt umsomehr auf die von ihm verordneten Mengen, wie solches bei den flüssigen Arzneimitteln bereits angedeutet ist, als bei den Taxen **a**), **d**), **e**) und **f**) nicht nur allein die Preise der verwendeten Gefässe, sondern auch die für Bereitung der Salben in Ansatz kommenden Arbeitslöhne steigen.

Betreffs der Verschiedenheit der Preisabstufungen der Töpfe nach den verschiedenen Taxen wird auf die Taxe Seite 6 besonders hingewiesen.

Betreffs der Arbeitslöhne ist Folgendes zu bemerken:

In den Taxen **b**), **c**) und **g**) ist nur ein Arbeitspreis, gleichviel für jede Menge und jede Art von Salben ausgeworfen; dagegen unterscheiden die Taxen **a**), **d**) und **f**) je nach den in die Salben eingehenden Substanzen drei verschiedene Arten der Berechnung und der Steigerung bei verschiedenen Mengen von Salbe.

Taxe **e**) unterscheidet zwar ebenfalls drei verschiedene Arten der Bereitung von Salben, hat aber keine Steigerung für verschiedene Mengen der zu bereitenden Salben.

Es ergiebt sich die oben bei den Arbeitspreisen bereits aufgeführte Skala:

1. Die Salbe wird einfach durch Mischen mehrerer Salben oder Fette, oder von Salben und Fetten mit flüssigen Substanzen ohne Schmelzen bereitet.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis bis 50,0 gr. | —.10 | —.25 | —.20 | —.10 | —.20 | —.10 | —.25 |
| „ „ 100,0 „ | —.15 | | | —.15 | | —.15 | |
| „ „ 200,0 „ | —.25 | | | —.25 | | —.25 | |
| „ für grössere Mengen | —.30 | | | —.30 | | —.30 | |

Bei den Taxen **a**), **b**). **d**) und **f**) tritt zu diesen Arbeitspreisen noch der Arbeitslohn von 3 Pf. bezw. bei Taxe **g**) von 5 Pf.; für das Abwägen eines jeden einzelnen in die Salbe eingehenden Arzneimittels, während bei Taxe **c**) ein Pauschalbetrag von 20 Pf. für sämmtliche Wägungen zugerechnet wird.

Der Arzt darf **nicht** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Unguenti Hydrargyri albi 50,0 gr. | —.75 | —.75 | —.75 | 1.— | 1.— | —.75 | —.75 |
| Balsami peruviani nigri . 4,0 „ | —.20 | —.16 | —.16 | —.16 | —.20 | —.20 | —.20 |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | 1.29 | 1.47 | *1.41 | 1.49 | 1.52 | 1.29 | 1.45 |
| abgerundet . . . . | 1.29 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.29 | 1.45 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Unguenti Hydrargyri albi 46,0 gr. | —.69 | —.69 | —.69 | —.92 | —.92 | —.69 | —.69 |
| Balsami peruviani nigri . 4,0 „ | —.20 | —.16 | —.16 | —.16 | —.20 | —.20 | —.20 |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.10 | —.25 | —.20 | —.10 | | —.10 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | 1.15 | 1.31 | *1.35 | 1.34 | 1.42 | 1.15 | 1.34 |
| abgerundet . . . . | 1.15 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.45 | 1.15 | 1.30 |
| **Ersparniss** in $^0/_0$ ca. | **10¼** | **10¼** | **3½** | **10¼** | **6½** | **10¼** | **10¼** |

* Gefässgrenze liegt erst bei 100.0.

---

Der Arzt darf **nicht** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chloroformii . . . . . . 5,0 gr. | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Adipis suilli . . . . . . 50.0 „ | —.50 | —.40 | —.25 | —.40 | —.25 | —.50 | —.50 |
| M. f. ungt. D. ad oll. griseam. S. Zum Einreiben. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | —.92 | 1.04 | * —.83 | —.81 | —.65 | —.92 | 1.08 |
| abgerundet . . . . | —.92 | 1.— | ⁰ —.85 | —.85 | —.65 | —.92 | 1.05 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chloroformii . . . . . . 5,0 gr. | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Adipis suilli q. s. ad . . 50,0 „ | —.45 | —.36 | —.23 | —.36 | —.23 | —.45 | —.45 |
| M. f. ungt. D. ad oll. griseam. S. Zum Einreiben. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.10 | —.25 | —.20 | —.10 | | —.10 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | —.79 | —.90 | * —.81 | —.70 | —.61 | —.79 | —.98 |
| abgerundet . . . . | —.79 | —.90 | ⁰ —.85 | —.70 | —.65 | —.79 | 1.— |
| **Ersparniss** in $^0/_0$ ca. | **14¼** | **10** | — | **17¼** | — | **14¼** | **5** |

* Gefässgrenze liegt erst bei 100,0. ⁰ Ersparniss geht durch die Aufrundung verloren.

Ein Unterschied in der therapeutischen Wirkung der beiden Ordinationen dürfte wohl nicht zu beobachten sein.

Die Preisdifferenz beträgt nach den einzelnen Taxen von 6 Pf. bis 16 Pf. oder ca. $6^1/_2$ % bis $17^3/_4$ %, von welchen 2 Pf. bis 10 Pf. auf die Differenz durch die Töpfe entfallen.

2. Die Salbe wird durch Mischen von Pulvern, Extrakten, Salzen und dergleichen mit Salben oder Fetten ohne Schmelzen bereitet.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis bis 50,0 gr. | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | —.30 | —.15 | —.25 |
| „ „ 100,0 „ | —.25 | | | —.25 | | —.25 | |
| „ „ 200,0 „ | —.40 | | | —.40 | | —.40 | |
| „ für grössere Mengen | —.50 | | | —.50 | | —.50 | |

Hierzu treten wie oben bei 1 die Arbeitslöhne bezw. Pauschalbeträge für die Wägungen.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Hydrargyri oxydati flavi. 0,1 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Unguenti lenientis . . . 10,0 „ | —.20 | —.20 | —.15 | —.20 | —.15 | —.20 | —.20 |
| M. f. ungt. D. S. **Augensalbe.** | | | | | | | |
| 2 Wägungen | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 Topf, **weiss** | —.23 | —.23 | —.20 | —.12 | —.10 | —.23 | —.30 |
| | —.67 | —.79 | * —.78 | ° —.58 | † —.58 | —.67 | —.90 |
| abgerundet | —.67 | —.80 | —.80 | —.60 | —.60 | —.67 | —.90 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Hydrargyri oxydati flavi. 0,1 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Unguenti lenientis q. s. **ad** 10,0 „ | —.20 | —.20 | —.15 | —.20 | —.15 | —.20 | —.20 |
| M. f. ungt. D. S. **Augensalbe.** | | | | | | | |
| 2 Wägungen | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 Topf, **weiss** | —.15 | —.15 | —.20 | —.12 | —.10 | —.15 | —.25 |
| | —.59 | —.71 | * —.78 | ° —.58 | † —.58 | —.59 | —.85 |
| abgerundet | —.59 | —.75 | —.80 | —.60 | —.60 | —.59 | —.85 |
| **Ersparniss** in % ca. | **12** | **$6^1/_4$** | — | — | — | **12** | **$5^1/_2$** |

* Gefässgrenze liegt bei 100,0. ° Gefässgrenze liegt bei 25,0. † Gefässgrenze liegt bei 50,0.

(Die nach den einzelnen Taxen vorkommenden Preisdifferenzen sind lediglich durch die Ueberschreitung der Gefässgrenzen herbeigeführt.)

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Dermatoli . . . . . . . | 5,0 gr. | —.50 | —.50 | —.75 | —.60 | —.75 | —.50 | —.50 |
| Vaselini flavi . . . . . . | 50,0 „ | —.50 | * —.75 | ° —.50 | † —.30 | —.50 | —.50 | —.50 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | | —.25 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | | 1.44 | 1.81 | 1.75 | 1.28 | 1.67 | 1.44 | 1.50 |
| abgerundet . . . . | | 1.44 | 1.80 | 1.75 | 1.25 | 1.70 | 1.44 | 1.50 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Dermatoli . . . . . . . | 5,0 gr. | —.50 | —.50 | —.75 | —.60 | —.75 | —.50 | —.50 |
| Vaselini flavi q. s. **ad** | 50,0 „ | —.45 | * —.68 | ° —.45 | † —.27 | —.45 | —.45 | —.45 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salbenmischung . . . . | | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | | 1.26 | 1.64 | 1.70 | 1.18 | 1.60 | 1.26 | 1.40 |
| abgerundet . . . . | | 1.26 | 1.60 | 1.70 | 1.15 | 1.60 | 1.26 | 1.40 |
| **Ersparniss** in % ca. | | $12^{1}/_{2}$ | 11 | 3 | 8 | 6 | $12^{1}/_{2}$ | $6^{3}/_{4}$ |

* Vasel. Americ. ° Ungt. Paraffini. † Vasel. flav. German.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Jodoformii . . . . . . . | 2,5 gr. | —.25 | —.38 | —.30 | —.30 | —.38 | —.25 | —.25 |
| Ungt. Paraffini . . . . . . . | | —.25 | —.25 | —.25 | —.25 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Lanolini. . . . . | āā 25,0 gr. | —.38 | —.38 | —.38 | —.38 | —.50 | —.38 | —.38 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | } —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salbenmischung . . . . | | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | | —.25 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | | 1.35 | 1.60 | 1.43 | 1.34 | 1.55 | 1.35 | 1.43 |
| abgerundet . . . . | | 1.35 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.55 | 1.35 | 1.40 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Jodoformii . . . . . . . | 2,5 gr. | —.25 | —.38 | —.30 | —.30 | —.38 | —.25 | —.25 |
| Ungt. Paraffini . . . . . . . | | —.24 | —.24 | —.24 | —.24 | —.24 | —.24 | —.24 |
| Lanolini . . āā q. s. **ad** | 50,0 „ | —.36 | —.36 | —.36 | —.36 | —.48 | —.36 | —.36 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | } —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salbenmischung . . . . | | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | | 1.19 | 1.47 | 1.40 | 1.24 | 1.50 | 1.19 | 1.35 |
| abgerundet . . . . | | 1.19 | 1.45 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.19 | 1.35 |
| **Ersparniss** in % ca. | | 12 | $9^{1}/_{2}$ | — | $7^{3}/_{4}$ | $3^{1}/_{4}$ | 12 | $3^{1}/_{2}$ |

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Argenti nitrici . . . . 1,0 gr. | —.20 | —.40 | —.30 | —.25 | —.30 | —.20 | —.20 |
| Vaselini flavi . . . . . 50,0 „ | —.50 | * —.75 | ° —.50 | † —.30 | —.50 | —.50 | —.50 |
| Aquae destillatae q. s. (berechtigter Zusatz des Apothekers) . . . | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | | —.25 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | 1.20 | 1.77 | 1.30 | —.99 | 1.25 | 1.26 | 1.30 |
| abgerundet . . . . | 1.20 | 1.75 | 1.30 | 1.— | 1.25 | 1.20 | 1.30 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Argenti nitrici . . . . . . . . | —.20 | —.40 | —.30 | —.25 | —.30 | —.20 | —.20 |
| Aquae destillatae . . āā 1,0 gr. | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Vaselini flavi q. s. **ad** 50,0 „ | —.48 | * —.72 | ° —.48 | † —.29 | —.48 | —.48 | —.48 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | 1.05 | 1.64 | 1.28 | —.91 | 1.21 | 1.05 | 1.23 |
| abgerundet . . . . | 1.05 | 1.60 | 1.25 | —.95 | ** 1.25 | 1.05 | 1.20 |
| **Ersparniss** in % ca. | **12½** | **9** | **3¾** | **5** | — | **12½** | **7¾** |

* Vasel. flav. Americ. ° Ungt. Paraffini. † Vasel. flav. German. ** Ersparniss durch die Aufrundung verloren.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Spiritus q. s. (berechtigter Zusatz des Apothekers) . . . . | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Amyli . . . . . . . . . | —.04 | —.12 | —.04 | —.03 | —.04 | —.04 | —.05 |
| Zinci oxydati crudi āā 12,0 gr. | —.06 | —.06 | —.06 | —.06 | —.06 | —.06 | —.06 |
| Vaselini flavi . . . . . 25,0 „ | —.25 | * —.38 | ° —.25 | † —.15 | —.25 | —.25 | —.25 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.30 | —.15 | —.25 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | | —.25 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.13 | —.25 | —.10 | —.12 | —.12 | —.13 | —.15 |
| | —.96 | 1.29 | —.90 | —.79 | —.85 | —.96 | 1.11 |
| abgerundet . . . . | —.96 | 1.25 | ** -.90 | —.80 | ** -.85 | —.96 | 1.10 |

| sondern der Arzt **muss** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . . . . . | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Spiritus . . . . . . . āā 1,0 gr. | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Amyli . . . . . . . . . . . . | —.04 | —.04 | —.04 | —.03 | —.04 | —.04 | —.05 |
| Zinci oxydati crudi . āā 12,0 gr. | —.06 | —.06 | —06 | —.06 | —.06 | —.06 | —.06 |
| Vaselini flavi q. s. **ad** 50,0 „ | —.24 | * —.36 | ° —.24 | † —.15 | —.24 | —.24 | —.24 |
| M. f. ungt. D. S. Salbe. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.30 | —.15 | —.25 |
| 1 Salbenmischung . . . . | —.15 | —.25 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 grauer Topf . . . . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | —.82 | 1.09 | —.89 | —.72 | —.82 | —.82 | 1.05 |
| abgerundet . . . . | —.82 | 1.05 | ** -.90 | —.75 | ** -.85 | —.82 | 1.05 |
| **Ersparniss** in % ca. | **14½** | **16** | — | **6¼** | — | **14½** | **4½** |

* Vasel. flav. Americ. ° Ungt. Paraffini. † Vasel. flav. German. ** Ersparniss durch die Aufrundung verloren.

Die Preisdifferenz beträgt bei den einzelnen Recepten von 2 Pf. bis 20 Pf. oder von 3 % bis 14½ %, ohne dass die therapeutische Wirkung bei den einzelnen Recepten durch die erzielte Ersparniss in irgend einer Weise beeinträchtigt würde.

3. Die Salbe wird durch Kochen oder Schmelzen einschliesslich Zumischen anderer Substanzen und Agitiren bereitet. Da diese Bereitungsweise in der Praxis selten vorkommt, so sei hier auf dieselbe nur aufmerksam gemacht.

## D. Pulver, nicht getheilte.

### Pappschachteln.

§ 10.

Da nach einzelnen Taxen [**a**), **d**) und **f**)] ein Preisunterschied zwischen Pappschachteln „mit" (theurere Sorte) und „ohne" (billigere Sorte) Falz besteht, so verordne der Arzt stets „Detur ad scatulam ordinariam", wenn überhaupt die Verwendung einer Schachtel unumgänglich nöthig erscheint.

Ferner achte der Arzt auf die Grenzen des Inhaltes der Schachteln, welche nach den verschiedenen Taxen, verschieden sind. Nach den Taxen **a**), **d**), **f**) und **g**) liegen die Inhaltsgrenzen bei respektive 30 Gramm, 100 Gramm, 200 Gramm u. s. w., nach Taxe **c**) liegen die Grenzen bei 50 Gramm, 150 Gramm und 250 Gramm; während die Taxe **b**) von 10 Gramm bis 50 Gramm und 100 Gramm abstuft, grenzt Taxe **e**) von 20 Gramm auf 50 Gramm und 100 Gramm u. s. w. ab.

Bei den Taxen **a**), **d**) und **f**) treten ausser den Differenzen für die verwendeten Schachteln auch noch Steigerungen für die Mischung von grösseren Mengen der gemischten Pulver ein, während die Taxen **b**), **c**), **e**) und **g**) eine solche Steigerung des Arbeitspreises für grössere Mengen von gemischten Pulvern nicht kennen.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Magisterii Bismuti . . . 2,0 gr. | —.10 | —.12 | —.20 | —.10 | —.20 | —.10 | —.08 |
| Natrii bicarbonici . . . 30,0 „ | —.15 | —.09 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordin. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.25 |
| | —.56 | * —.57 | ° —.65 | —.53 | † —.67 | —.56 | —.73 |
| abgerundet . . . . | —.56 | —.60 | —.65 | —.55 | —.70 | —.56 | —.75 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Magisterii Bismuti . . . 2,0 gr. | —.10 | —.12 | —.20 | —.10 | —.20 | —.10 | —.08 |
| Natrii bicarbonici q. s. **ad** 30,0 „ | —.14 | —.09 | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordin. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.08 | —.12 | —.10 | —.15 |
| | —.50 | * —.57 | ° —.64 | —.48 | † —.66 | —.50 | —.62 |
| abgerundet . . . . | —.50 | —.60 | —.65 | —.50 | —.70 | —.50 | —.65 |
| **Ersparniss** in % ca. | **10¾** | — | — | **10** | — | **10¾** | — |

* Gefässgrenze liegt bereits bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 50,0.
† Gefässgrenze liegt bereits bei 20,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,05 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Natrii bicarbonici . . . . . . | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Natrii salicylici . . . āā 5,0 gr. | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Elaeosacchari Menthae . . . } | —.10 | —.10 | —.10 | —.20 | —.10 | —.10 | —.10 |
| piperitae 20,0 gr. } | —.10 | —.12 | —.20 | —.10 | —.12 | —.10 | —.10 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | }—.20 | —.15 | —.25 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.25 |
| | —.91 | * 1.— | ° —.91 | 1.05 | † —.87 | —.91 | 1.20 |
| abgerundet . . . . | —.91 | 1.— | —.95 | 1.05 | —.90 | —.91 | 1.20 |

| sondern der Arzt **muss** schreiben: | Pr. V. St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morphii hydrochlorici . . 0,05 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Natrii bicarbonici . . . . . . | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Natrii salicylici . . . ää 5,0 „ | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Elaeosacchari Menthae . . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.20 | —.10 | —.10 | —.10 |
| piperitae q. s. **ad** 30,0 gr. | —.10 | —.12 | —.20 | —.10 | —.12 | —.10 | —.10 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.20 | —.15 | —.25 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.08 | —.12 | —.10 | —.15 |
| | —.86 | * 1.— | ° —.91 | 1.06 | † —.87 | —.86 | 1.10 |
| abgerundet . . . . | —.86 | 1.— | —.95 | 1.— | —.90 | —.86 | 1.10 |
| **Ersparniss** in % ca. | 5½ | — | — | 5 | — | 5½ | 8⅓ |

* Gefässgrenze liegt bereits bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 50,0. † Gefässgrenze liegt bereits bei 20,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V. St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Natrii bicarbonici . . . . . . | —.08 | —.05 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Magnesiae ustae . . ää 15,0 gr. | —.23 | —.30 | —.23 | —.23 | —.30 | —.23 | —.23 |
| Olei Menthae pip. . . gtt. I . | —.03 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.25 |
| | —.68 | * —.77 | ° —.66 | —.65 | † —.73 | —.68 | —.91 |
| abgerundet . . . . | —.68 | —.80 | —.70 | ** -.65 | —.75 | —.68 | —.95 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V. St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Olei Menthae pip. . . gtt. I . | —.03 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Natrii bicarbonici . . . . . . | —.08 | —.05 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Magnes. ustae ää q. s. **ad** 30,0 gr. | —.23 | —.30 | —.23 | —.23 | —.30 | —.23 | —.23 |
| M. f. pulv. D. ad scatal. ordinar. S. Messerspitzenweise. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.08 | —.12 | —.10 | —.15 |
| | —.63 | * —.77 | ° —.66 | —.61 | † —.73 | —.63 | —.81 |
| abgerundet . . . . | —.63 | —.80 | —.70 | ** -.65 | —.75 | —.63 | —.85 |
| **Ersparniss** in % ca. | 7½ | — | — | — | — | 7½ | 10½ |

* Gefässgrenze liegt bereits bei 10,0. ° Gefässgrenze liegt erst bei 50.0. † Gefässgrenze liegt bereits bei 20,0. ** Ersparniss geht durch die Abrundung verloren.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Zinci oxydati crudi. . . . . . | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Amyli . . . . . . . āā 15,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.04 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. | | | | | | | |
| S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.25 |
| | —.52 | * —.57 | ⁰ —.48 | —.48 | † —.50 | —.52 | —.73 |
| abgerundet . . . . | —.52 | —.60 | —.50 | —.50 | —.50 | —.52 | —.75 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Zinci oxydati crudi . . . . . | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 | —.08 |
| Amyli āā q. s. . . **ad** 30,0 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.04 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. | | | | | | | |
| S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.15 | —.10 | —.08 | —.12 | —.10 | —.15 |
| | —.47 | * —.57 | ⁰ —.48 | —.44 | † —.50 | —.47 | —.73 |
| abgerundet . . . . | —.47 | —.60 | —.50 | —.45 | —.50 | —.47 | —.65 |
| **Ersparniss** in % ca. | **10** | — | — | **10** | — | **10** | **13¼** |

* Gefässgrenze liegt bereits bei 10,0. ⁰ Gefässgrenze liegt erst bei 50,0.
† Gefässgrenze liegt bereits bei 20,0.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Natrii sulfurici sicci . 100,0 gr. | —.50 | —.80 | —.40 | —.40 | —.25 | —.50 | —.50 |
| „ bicarbonici . . 10,0 „ | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. D. ad scat. ordinar. | | | | | | | |
| S. Theelöffelweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.15 | —.15 | | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.25 | —.30 | —.15 | —.18 | —.25 | —.25 | —.30 |
| | 1.01 | 1.34 | —.80 | —.84 | —.75 | 1.01 | 1.10 |
| abgerundet . . . . | 1.01 | 1.30 | —.80 | —.85 | —.75 | 1.01 | 1.10 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Natrii bicarbonici . . . 10,0 gr. | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| „ sulfurici sicci q.s. **ad** 100,0 „ | —.45 | —.80 | —.36 | —.40 | —.23 | —.45 | —.45 |
| M. f. pulv. D. ad scatul. ordinar. | | | | | | | |
| S. Theelöffelweise. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | —.15 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.15 | —.20 | —.15 | —.12 | —.15 | —.15 | —.25 |
| | —.81 | 1.24 | —.76 | —.73 | —.63 | —.81 | 1.— |
| abgerundet . . . . | —.81 | 1.20 | * —.80 | —.75 | —.65 | —.81 | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | **20** | **7¼** | — | **11¼** | **13¼** | **20** | **9** |

* Ersparniss geht durch die Aufrundung verloren.

## E. Pulver, getheilte.

§ 11.

Die Dispensation dividirter (abgetheilter) Pulver ist im Allgemeinen eine der theuersten Arzneiformen und zwar durch die in Ansatz kommenden Arbeitslöhne.

Nach den Taxen **a**), **c**), **d**), **e**), **f**) und **g**) tritt zu dem Arbeitslohn für Abwägungen der einzelnen zu mischenden Arzneimittel und Mischen derselben, bezw. der Pauschalsumme für diese beiden Arbeiten, noch der Arbeitslohn für jedes der einzelnen dividirten Pulver; eine Ermässigung des Arbeitslohnes bei einer grösseren Anzahl von dividirten Pulvern tritt nicht ein.

Nach Taxe **b**) wird für das Mischen und Dividiren der ersten 2—5 Pulver 30 Pf. (bei Dispensation in Wachskapseln 36 Pf.), für jede weiteren 1—5 Pulver 10 Pf. (bew. 12 Pf.) mehr berechnet.

Der bayerische Arzt muss desshalb, wenn er die Verordnung von abgetheilten Pulvern für durchaus nöthig erachtet, eine durch 5 theilbare Anzahl von Pulvern verordnen.

Im Besonderen sei hier betreffs der Ersparniss bei abgetheilten Pulvern auf Folgendes aufmerksam gemacht:

a) Bei der Verordnung von Antifebrin, Antipyrin, Chinin, Natr. salicylic., Pulv. Ipecac. opiat. und anderen ähnlichen Arzneimitteln ist eine Mischung mit Sacch. alb. oder Sacch. Lactis unnütz und vertheuert die Ordination, ohne dass durch diese Vertheuerung irgend ein therapeutischer Effekt erzielt wird.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Natrii salicylici | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Sacchar. alb. āā 0,5 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. X. S. Alle 3 Stunden 1 Pulver. | | | | | | | |
| 2 Wägungen | —.06 | —.06 | } —.20 | —.06 | } —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Pulvermischung | —.10 | } —.40 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 10 Divisionen | —.50 | | —.40 | —.40 | —.30 | —.50 | —.50 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.94 | —.72 | —.88 | —.89 | —.84 | —.94 | 1.05 |
| abgerundet | —.94 | —.75 | —.90 | —.90 | —.85 | —.94 | 1.05 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Natrii salicylici 0,5 gr. | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Dent. Dos. X. S. Alle 3 Stunden 1 Pulver. | | | —.10 | | | | |
| 10 Divisionen | —.50 | —.40 | —.40 | —.40 | —.30 | —.50 | —.50 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.75 | —.65 | —.75 | —.70 | —.61 | —.75 | —.75 |
| abgerundet | —.75 | —.65 | —.75 | —.70 | —.65 | —.75 | —.75 |
| **Ersparniss** in % ca. | **20** | **13¼** | **16¾** | **22¼** | **23½** | **20** | **28½** |

In vielen Fällen wird es sich empfehlen, statt der abgetheilten Pulver die wirksamen Arzneistoffe in einer anderen Arzneiform, z. B. in Pillenform oder in Mixturform zu geben. Der aufmerksame Arzt wird mit Leichtigkeit aus den nachstehenden Beispielen ersehen, in welchen Fällen er eine andere und welche Form der Ordination er im Interesse der ökonomischen Receptur wählen kann.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Agaricini . . . . . 0,005 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Sacchari albi . . . . 0,5 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. X. S. Abends 1—2 Pulver. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | }—.40 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 10 Divisionen . . . . . | —.50 | | —.40 | —.40 | —.30 | —.50 | —.50 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.72 | —.54 | —.66 | —.64 | —.64 | —.72 | —.85 |
| abgerundet . . . . | —.72 | —.55 | —.70 | —.65 | —.65 | —.72 | —.85 |

Statt dessen Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Agaricini . . . . . . 0,05 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquiritiae depurati 1,0 „ | —.05 | —.05 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 | —.05 |
| Rad. Liq. pulv. q. s. ut fiant pilul. 25 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| D. ad scat. ordin. S. Abends 3—6 Stück zu nehmen. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | }—.35 | —.09 | —.15 |
| 1 Massaanstossen . . . . | —.10 | }—.30 | —.20 | —.10 | | —.10 | }—.30 |
| 1 Formiren . . . . . . | —.10 | | —.10 | —.10 | | —.10 | |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.08 | —.10 | —.10 | —.15 |
| | —.50 | —.62 | —.69 | —.48 | —.56 | —.50 | —.75 |
| abgerundet . . . . . . . | —.50 | —.65 | —.70 | —.50 | —.60 | —.50 | —.75 |
| **Ersparniss** in % . ca. | 30½ | — | — | 23 | 8 | 30½ | 11¾ |
| **Vertheuerung** in % ca. | — | 18 | — | — | — | — | — |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Strychnini nitrici . . 0,001 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.10 | —.10 | —.03 | —.05 |
| Sacchari albi . . . . 0,5 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. XX. S. Abends 1—2—3 Pulver. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | }—.60 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 20 Divisionen . . . . . | 1.— | | —.80 | —.80 | —.60 | 1.— | 1.— |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.24 | —.76 | 1.08 | 1.09 | 1.01 | 1.24 | 1.35 |
| abgerundet . . . . | 1.24 | —.80 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.24 | 1.35 |

| Statt dessen Pillen. | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Strychnini nitrici . . . 0,02 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.10 | —.10 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquiritiae venalis pulv. . | —.04 | —.04 | —.05 | —.04 | —.08 | —.04 | —.05 |
| Radicis Liquiritiae pulv. āā 2,5 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Glycerini q. s. ut fiant pilulae 50. | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| D. ad scat. ordinar. S. Abends 3—6—9 Pillen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Massaanstossen . . . . | —.10 | }—.40 | }—.20 | —.10 | }—.45 | —.10 | }—.40 |
| 1 Formiren . . . . . . . | —.20 | | —.20 | —.20 | | —.20 | |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.08 | —.10 | —.10 | —.15 |
| | —.65 | —.77 | —.81 | —.70 | —.79 | —.65 | —.95 |
| abgerundet . . . . | —.65 | —.80 | —.85 | —.70 | —.80 | —.65 | —.95 |
| **Ersparniss** in % ca. | **47½** | — | **19** | **33¼** | **24** | **47½** | **29½** |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Stibii sulfurati aurantiaci 0,04 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Morphii hydrochlorici . . 0,01 „ | —.10 | —.12 | —.10 | —.16 | —.20 | —.10 | —.10 |
| Sacchari albi . . . . . 0,5 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. XX. S. Viermal täglich ein Pulver. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Pulvermischung . . . . | —.10 | }—.60 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 20 Divisionen . . . . . | 1.— | | —.80 | —.80 | —.60 | 1.— | 1.— |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.37 | —.89 | 1.18 | 1.23 | 1.14 | 1.37 | 1.50 |
| abgerundet . . . . | 1.37 | —.90 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.37 | 1.50 |

Statt dessen Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Stibii sulfurati aurantiaci 0,8 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Morphii hydrochlorici . . 0,2 „ | —.10 | —.12 | —.10 | —.16 | —.20 | —.10 | —.10 |
| Succi Liquiritiae depurati 1,5 „ | —.08 | —.08 | —.05 | —.03 | —.04 | —.08 | —.08 |
| Rad. Liqu. q. s. ut. fiant pilul. 50 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| D. ad scat. ordinar. S. Viermal täglich 2—3 Pillen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Massaanstossen . . . . | —.10 | }—.40 | | —.10 | }—.45 | —.10 | }—.40 |
| 1 Formiren . . . . . . . | —.20 | | —.20 | —.20 | | —.20 | |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.10 | —.20 | —.08 | —.10 | —.10 | —.15 |
| | —.76 | —.88 | —.81 | —.75 | —.85 | —.76 | 1.03 |
| abgerundet . . . . | —.76 | —.90 | —.85 | —.75 | —.85 | —.76 | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | **44½** | — | **26¼** | **37½** | **26¾** | **44½** | **33⅓** |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chinini hydrochlorici . . . . . . | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 | —.20 | —.15 | —.15 |
| Ferri reducti . . . . āā 0,05 gr. | —.03 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sacchari albi . . . . . 0,5 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. XX. S. Zweistündlich 1 Pulver zu nehmen. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.20 | —.09 | —.15 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | }—.60 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 20 Divisionen . . . . . | 1.— | | —.80 | —.80 | —.60 | 1.— | 1.— |
| 1 Convolut . . . . . . | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.42 | —.92 | 1.25 | 1.29 | 1.14 | 1.42 | 1.55 |
| abgerundet . . . . | 1.42 | —.95 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.42 | 1.55 |

Statt dessen Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chinini hydrochlorici . . . . . . | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 | —.20 | —.15 | —.15 |
| Ferri reducti . . . . āā 1,0 gr. | —.03 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquirit. depurat. . 2,0 „ | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Rad. Liquirit. pulv. q. s. . . . | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Fiant pilul. 50. D. ad scat. ordinar. S. Zweistündlich 2—3 Pillen zu nehmen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | }—.55 | —.12 | —.20 |
| 1 Massaanstossen . . . . | —.10 | }—.40 | | —.10 | | —.10 | }—.40 |
| 1 Pillenformiren . . . . | —.20 | | —.20 | —.20 | | —.20 | |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.08 | —.10 | —.10 | —.15 |
| | —.83 | —.93 | —.79 | —.81 | —.96 | —.83 | 1.10 |
| abgerundet . . . . | —.83 | —.95 | —.80 | —.85 | 1.— | —.83 | 1.10 |
| **Ersparniss** in % ca. | **41½** | — | **36** | **32** | **13** | **41½** | **29** |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ferri carbonici saccharati . . . | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Chinini sulfurici . . āā 0,25 gr. | —.45 | —.45 | —.36 | —.45 | —.45 | —.45 | —.45 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. XII ad capsulas **amylaceas.** | | | | | | | |
| S. Dreimal täglich eine Kapsel. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | }—.75 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 12 Limousin-Kapseln . . | 1.20 | | —.84 | —.72 | —.96 | 1.20 | 1.20 |
| 1 Schachtel . . . . . . | —.— | —.— | —.— | —.— | —.10 | —.— | —.— |
| | 1.84 | 1.31 | 1.43 | 1.36 | 1.77 | 1.84 | 1.95 |
| abgerundet . . . . | 1.84 | 1.80 | 1.40 | 1.35 | 1.80 | 1.84 | 1.95 |

## Statt dessen Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ferri carbonici saccharati . . . | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Chinini sulfurici . . . āā 3,0 gr. | —.45 | —.45 | —.36 | —.45 | —.45 | —.45 | —.45 |
| Succi Liquiritiae venalis pulv. . | —.03 | —.03 | —.04 | —.03 | —'06 | —.03 | —.05 |
| Radicis Liquiritiae pulv. āā 2,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Glycerini q. s. ut fiant pilul. No. 50. | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| D. ad scat. ordin. S. Dreimal täglich 4—5 Pillen. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | }—.45 | —.15 | —.25 |
| 1 Massaanstossen . . . . | —.10 | }—.40 | | —.10 | | —.10 | }—.40 |
| 1 Formiren . . . . . . | —.20 | | —.20 | —.20 | | —.20 | |
| 1 Schachtel ohne Falz . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.08 | —.10 | —'10 | —.15 |
| | 1.12 | 1.24 | —.96 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 1.45 |
| abgerundet . . . . | 1.12 | 1.20 | 1.— | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.45 |
| **Ersparniss** in % ca. | **39** | **7¾** | **28½** | **18½** | **33¼** | **39** | **25¾** |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati pulv. . . 1,0 gr. | —.24 | —.18 | —.15 | —.15 | —.22 | —.24 | —.24 |
| Dentur Doses XII. S. Dreimal täglich ein Pulver. | | | —.10 | | | | |
| 12 Wachskapseln . . . . | —.72 | —.60 | —.60 | —.48 | —.48 | —.72 | —.72 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.96 | —.78 | —.85 | —.63 | —.76 | —.96 | —.96 |
| abgerundet . . . . | —.96 | —.80 | —.85 | —.65 | —.80 | —.96 | 1.— |

## Statt dessen Mixtur.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati . . . . . 12,0 gr. | —.18 | —.18 | —.15 | —.15 | —.18 | —.18 | —.18 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 180,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.68 | — 68 | —.84 | —.65 | —.77 | —.68 | —.72 |
| abgerundet . . . . | —.68 | —.70 | —.85 | —.65 | —.80 | —.68 | —.75 |
| **Ersparniss** in % ca. | **30** | **12½** | — | — | — | **30** | **25** |

---

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati pulv. . . 4,0 gr. | 1.60 | 1.20 | —.96 | —.96 | 1.44 | 1.60 | 1.60 |
| Dentur Doses XX. S. Nach Bericht 1 Pulver. | | | —.10 | | | | |
| 20 Wachskapseln . . . . | 1.20 | —.72 | 1.— | —.80 | —.80 | 1.20 | 1.20 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 2.80 | 1.92 | 2.06 | 1.76 | 2.30 | 2.80 | 2.80 |
| abgerundet . . . . | 2.80 | 1.90 | 2.05 | 1.75 | 2.30 | 2.80 | 2.80 |

| Statt dessen Mixtur. | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati . . . . . 30,0 gr. | 1.20 | 1.20 | —.96 | —.96 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 300,0 „ | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 |
| M. D. S. Jedesmal 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| | 1.77 | 1.77 | 1.67 | 1.48 | 1.86 | 1.77 | 1.81 |
| abgerundet . . . . | 1.77 | 1.75 | 1.65 | 1.45 | 1.90 | 1.77 | 1.80 |
| **Ersparniss** in % ca. | **37** | **8** | **19½** | **17** | **17½** | **37** | **36** |

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammonii bromati . . . . . . | —.15 | —.20 | —.20 | —.20 | —.30 | —.20 | —.15 |
| Kalii bromati pulv. . āā 1,0 gr. | —.20 | —.15 | —.12 | —.12 | —.18 | —.15 | —.20 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. X. S. Zweimal täglich 1 Pulver. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.48 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 10 Wachskapseln . . . . | —.60 | | —.50 | —.40 | —.40 | —.60 | —.60 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.11 | —.89 | 1.02 | —.88 | 1.14 | 1.11 | 1.20 |
| abgerundet . . . . | 1.11 | —.90 | 1.— | —.90 | 1.15 | 1.11 | 1.20 |

| Statt dessen Mixtur. | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammonii bromati . . . . . . | —.15 | —.20 | —.20 | —.20 | —.30 | —.15 | —.15 |
| Kalii bromati . . . āā 10,0 gr. | —.15 | —.15 | —.12 | —.12 | —.15 | —.15 | —.15 |
| Aquae destillatae . **ad** 150,0 „ | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 |
| M. D. S. Zweimal tägl. 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.81 | —.86 | —.99 | —.83 | 1.02 | —.81 | —.87 |
| abgerundet . . . . | —.81 | —.90 | 1.— | —.85 | 1.05 | —.81 | —.90 |
| **Ersparniss** in % ca. | **27¼** | — | — | **5½** | **8¾** | **27¼** | **25** |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammonii bromati . . . . . . | —.60 | —.80 | —.80 | —.80 | 1.20 | —.60 | —.60 |
| Kalii bromati pulv. . āā 4.0 gr. | —.80 | —.60 | —.48 | —.48 | —.72 | —.80 | —.80 |
| M. f. pulv. Dent. Dos. X. S. Täglich 1 Pulver. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 |
| 1 Mischung . . . . . . | —.10 | —.48 | | —.10 | | —.10 | —.15 |
| 10 Wachskapseln . . . . | —.60 | | —.50 | —.40 | —.40 | —.60 | —.60 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 2.16 | 1.94 | 1.98 | 1.84 | 2.58 | 2.16 | 2.25 |
| abgerundet . . . . . . . | 2.16 | 1.90 | 1.95 | 1.80 | 2.60 | 2.16 | 2.25 |

### Statt dessen Mixtur.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammonii bromati . . . . . . . | —.60 | —.80 | —.80 | —.80 | 1.20 | —.60 | —.60 |
| Kalii bromati. . . . ää 40,0 gr. | —.60 | —.60 | —.48 | —.48 | —.60 | —.60 | —.60 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 300,0 „ | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 | —.11 |
| S. Tägl. 2 Esslöffel voll zu nehmen. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | } —.20 | —.09 | } —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | } —.20 | —.15 | } | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.25 | —.25 | —.20 | —.20 | —.25 | —.25 | —.25 |
| | 1.80 | 2.— | 1.99 | 1.83 | 2.46 | 1.80 | 1.86 |
| abgerundet . . . . . . . | 1.80 | 2.— | 1.95 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 1.85 |
| **Ersparniss** in % ca. . . | $16\frac{3}{4}$ | — | — | — | $3\frac{3}{4}$ | $16\frac{3}{4}$ | $17\frac{3}{4}$ |
| **Vertheuerung** in % ca. | — | $5\frac{1}{4}$ | — | — | — | — | — |

c) Unbedingt zu verwerfen und bei Kassenrezepten unzulässig ist die Verordnung der dividirten Pulver ad **capsulas amylaceas** oder **gelatinosas.**

Im Falle die Pulverform sich nicht wie vorstehend in den verschiedenen ausführlich gegebenen Beispielen durch eine andere Arzneiform (Pillen, Mixtur) ersetzen lässt und der ordinirende Arzt aus bestimmten Gründen von der Dispensation in Pulverform nicht abgehen will, oder die Zahl der zu ordinirenden Pulver eine zu geringe ist (unter und bis 8 Stück), dann empfiehlt es sich aus Sparsamkeitsgründen, dividirte Pulver in einfache Papierkapseln zu verordnen und als Handverkauf für 10 Pf. einfache, gewöhnliche Pulveroblaten auf dem Recepte zu notiren und dem Patienten die nöthige Anweisung für die Benutzung der Oblaten zu geben.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chinini hydrochlorici . . 0,25 gr. | —.23 | —.23 | —.23 | —.30 | —.30 | —.23 | —.23 |
| Dent. Dos. VI ad caps. **amylac.** | | | —.10 | | | | |
| 6 Limousin-Kapseln . . . | —.60 | —.60 | —.42 | —.36 | —.48 | —.60 | —.60 |
| | —.83 | —.83 | —.75 | —.66 | —.78 | —.83 | —.83 |
| abgerundet . . . . | —.83 | —.85 | —.75 | —.70 | —.80 | —.83 | —.85 |

### Einfacher.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Chinini hydrochlorici . . 0,25 gr. | —.23 | —.23 | —.25 | —.30 | —.30 | —.23 | —.25 |
| Dent. Dos. VI. | | | —.10 | | | | |
| 6 Divisionen . . . . . . | —.30 | —.40 | —.24 | —.24 | —.18 | —.30 | —.30 |
| 1 Convolut . . . . . . | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| Oblaten . . . . . . . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| | —.63 | —.73 | —.67 | —.64 | —.64 | —.63 | —.65 |
| abgerundet . . . . | —.63 | —.75 | —.70 | —.65 | —.65 | —.63 | —.65 |
| **Ersparniss** in % ca. | 24 | $11\frac{3}{4}$ | $6\frac{2}{3}$ | $7\frac{1}{4}$ | 18 | 24 | $23\frac{1}{2}$ |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.42 | —.60 | —.60 | —.60 | —.60 | —.42 | —.42 |
| D. ad capsul. **amylac.** Dos. XII. | | | | | | | |
| S. Nach Bericht . . . . . . | | | —.10 | | | | |
| 12 Limousin-Kapseln . . . | 1.20 | —.75 | —.84 | —.72 | —.96 | 1.20 | 1.20 |
| | 1.62 | 1.35 | 1.54 | 1.32 | 1.56 | 1.62 | 1.62 |
| abgerundet . . . . | 1.62 | 1.35 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.62 | 1.60 |

Einfacher.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.42 | —.60 | —.60 | —.60 | —.60 | —.42 | —.42 |
| Dent. Dos. XII. S. Nach Bericht | | | —.10 | | | | |
| 12 Divisionen . . . . . | —.60 | —.50 | —.48 | —.48 | —.36 | —.60 | —.60 |
| Oblaten. . . . . . . . . | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.15 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.12 | 1.20 | 1.28 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
| abgerundet . . . . | 1.12 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.15 |
| **Ersparniss** in % ca. | **31** | **11** | **16¾** | **11½** | **28¼** | **31** | **28** |

d) In vielen Fällen ist bei abgetheilten Pulvern für längeren Gebrauch dadurch eine Ersparniss möglich, dass bei zuverlässigen Patienten das Doppelte der Einzelgabe verschrieben und das Einnehmen von halben Pulvern angeordnet wird.

Beispiel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acetanilidi . . . . . . . 0,5 gr. | —.08 | —.08 | —.08 | —.15 | —.25 | —.08 | —.08 |
| Dent. Dos. X. | | | —.10 | | | | |
| S. Nach Bericht 1 Pulver. | —.50 | —.40 | —.40 | —.40 | —.30 | —.50 | —.50 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.58 | —.48 | —.58 | —.55 | —.61 | —.58 | —.58 |
| abgerundet . . . . | —.58 | —.50 | —.60 | —.55 | —.65 | —.58 | —.60 |

Verbilligt.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acetanilidi . . . . . . . 1,0 gr. | —.08 | —.08 | —.08 | —.15 | —.25 | —.08 | —.08 |
| Dent. Dos. V. | | | —.10 | | | | |
| S. Nach Bericht ½ Pulver. | —.25 | —.30 | —.20 | —.20 | —.15 | —.25 | —.25 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | —.33 | —.38 | —.38 | —.35 | —.46 | —.33 | —.33 |
| abgerundet . . . . | —.33 | —.40 | —.40 | —.35 | —.50 | —.33 | —.35 |
| **Ersparniss** in % ca. | **43** | **20** | **33⅓** | **36⅓** | **23** | **43** | **41⅔** |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ferneres Beispiel.** | | | | | | | |
| **Rp.** Phenacetini . . . . . . 0,5 gr. | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 |
| Dent. Dos. X. | | | —.10 | | | | |
| S. Nach Bericht 1 Pulver. | —.50 | —.40 | —.40 | —.40 | —.30 | —.50 | —.50 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.11 | 1.25 | 1.25 |
| abgerundet . . . . | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 |
| **Verbilligt.** | | | | | | | |
| **Rp.** Phenacetini . . . . . . 1,0 gr. | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 | —.75 |
| Dent. Dos. V. | | | —.10 | | | | |
| S. Nach Bericht 1/2 Pulver. | —.25 | —.30 | —.20 | —.20 | —.15 | —.25 | —.25 |
| 1 Convolut in Brieftaschenf. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— |
| | 1.— | 1.05 | 1.05 | —.95 | —.96 | 1.— | 1.— |
| abgerundet . . . . | 1.— | 1.05 | 1.05 | —.95 | 1.— | 1.— | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | **20** | **8 1/4** | **16** | **17 1/2** | **13** | **20** | **20** |

Betreffs der Dispensation der dividirten Pulver sei hier noch bemerkt, dass nur nach Taxe **e**) ein Pulverconvolut in Brieftaschenform mit 6 Pf. in Ansatz kommen darf, während bei den anderen Taxen der zur Dispensation nöthige Papierbeutel bezw. das Einschlagepapier in dem Arbeitslohn für das Abtheilen der Pulver enthalten ist. Nach den Taxen **a**), **f**) und **g**) ist die Verwendung von Pulverkästchen (Convoluten, Pulverschiebern) bei Rezepten für Krankenkassen verboten.

---

## F. Trochisci.

§ 12.

Von komprimirten Arzneimitteln dürfen nur die als Handverkaufsartikel aufgeführten Trochiscen verordnet werden, da die Anfertigung auf Grund einer Verordnung unpraktisch und theuer ist.

---

## G. Pillen.

§ 13.

Bei der Verordnung der Pillen achte der Arzt auf die Anzahl der Pillen, welche er anfertigen lässt.

Während bei den Taxen **a**), **b**), **c**), **d**) und **f**) der Arbeitslohn für das Formiren von 30 zu 30 Pillen steigt, so tritt bei den Taxen **e**) und **g**) die Steigerung des Arbeitspreises für das Formiren schon von 25 zu 25 Pillen ein.

Ausser dem Arbeitslohne für das Formiren der Pillen kommt noch das Abwägen der in die Pillen eingehenden Substanzen, sowie

das Anstossen der Masse [Taxe **a**), **d**) und **f**)] oder eine Pauschalsumme [Taxen **b**), **c**), **e**) und **g**)] für die genannten Arbeiten in Ansatz. Auf dem Recepte schreibe der Arzt die von ihm gewünschten, wirksamen Stoffe und die von ihm gewünschte Anzahl Pillen auf; als Constituens muss dann seitens des anfertigenden Apothekers auf Grund der Bestimmungen des Deutschen Arzneibuches, dritte Ausgabe, Seite 236, ein Gemisch aus Pulv. Succi Liquiritiae ven. und Pulv. Rad. Liquiritiae unter Zusatz von etwas Glycerin verwendet werden, um Pillen von 0,1 Gewicht herzustellen.

Bei der Verordnung von Pillen mit Sapo medicat., Sapo jalapin., Extr. Rhei composit., Extr. Aloes u. s. w. genügen einige Tropfen Spiritus oder Spirit. saponat., um eine knetsame, leicht formirbare Pillenmasse zu erzielen.

Das Verschreiben der Pillen ist somit durch die angezogene Bestimmung für den Arzt erleichtert und vereinfacht.

Da die Pillenform sich am besten von allen Arzneiformen hält und eine äusserst genaue Dosirung gestattet, ferner auch in den meisten Fällen die billigste Arzneiform ist, wie in den Beispielen bei den dividirten Pulvern gezeigt ist, so kann die Verordnung von Pillen nicht genug empfohlen werden, nur muss von der Verordnung und Verwendung von Mucilago Gummi arabici zur Herstellung von Pillen d r i n g e n d gewarnt werden, da Pillen, bei welchen Gummischleim verwendet ist, sehr schnell erhärten und oft den Darmtractus ungelöst passiren.

Das Ueberziehen der Pillen mit Gelatine, Cacao, Zucker oder mit Silberfolie ist zu unterlassen und dürfen von „überzogenen" Pillen nur die in der Handverkaufstaxe aufgeführten verordnet werden.

Kreosotpillen und Kreosotkapseln sollen nicht über 100 Stück auf einmal und nur mit dem in der Handverkaufstaxe aufgeführten Gehalte verordnet werden, da durch die Verordnung von Kreosotkapseln oder Kreosotpillen mit einem höheren Kreosotgehalte unnütze Kosten entstehen.

## H. Pflaster.

§ 14.

Die Bereitung von Pflastern kommt selten vor.

Im Bedarfsfalle dürfen als gestrichene Pflaster nur die als Handverkaufsartikel aufgeführten verordnet werden.

Sonstige Pflastermassen können durch den Patienten leicht selbst gestrichen werden.

## I. Species.

§ 15.

Da das Mischen und Dispensiren von Species nach den verschiedenen Taxen sehr theuer ist, so verordne der Arzt von gemischten Species nur die als Handverkaufsartikel aufgeführten gemischten Species und verordne im Bedarfsfalle anderer Species die verschiedenen Arzneistoffe einzeln als Handverkaufsartikel und lasse die Mischung durch den Patienten vornehmen.

---

## K. Suppositorien.

§ 16.

Die Bereitung und Dispensation von Suppositorien ist sehr theuer und ist deshalb diese Arzneiform thunlichst zu vermeiden.

---

## L. Elaeosaccharum.

§ 17.

Die Verordnung von Elaeosaccharum zu Mixturen ist unter allen Umständen zu vermeiden, da nach der Taxe neben dem Preise für das Auflösen auch noch die Mengung eines feinen Pulvers berechnet wird. Erscheint die Ordination des betreffenden ätherischen Oeles unumgänglich nothwendig, so verordne man Sirupus simplex und das gewünschte ätherische Oel.

Statt 2,0 Gramm Elaeosaccharum werden 3,0 Gramm Sirupus simplex mit 1 Tropfen des betreffenden ätherischen Oeles verordnet.

---

## M. Aromatische Wässer.

§ 18.

Die Anwendung von aromatischen Wässern zur Bereitung von Mixturen ist thunlichst zu beschränken, eventuell, wenn durchaus nothwendig, durch einige Tropfen ätherisches Oel (1 Tropfen auf 50 gr. destillirtes Wasser) zu ersetzen.

| Statt folgender Ordination: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. Kalii bromati . . . . . 10,0 gr. | —.15 | —.15 | —.12 | —.12 | —.15 | —.15 | —.15 |
| Aquae Menthae piperit. ad 200,0 „ | —.48 | —.38 | —.38 | —.39 | —.29 | —.48 | —.48 |
| M. D. S. Nach Bericht. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.04 | —.94 | 1.10 | —.92 | —.94 | 1.04 | 1.08 |
| abgerundet . . . . | 1.04 | —.95 | 1.10 | —.95 | —.95 | 1.04 | 1.05 |

ist zu schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Kalii bromati . . . . . 10,0 gr. | —.15 | —.15 | —.12 | —.12 | —.15 | —.15 | —.15 |
| Olei Menthae piperit . gtt. IV. | —.04 | —.05 | —.08 | —.08 | —.06 | —.04 | —.05 |
| Aquae destillatae q. s. ad 200,0 gr. | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Nach Bericht. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.73 | —.74 | —.90 | —.74 | —.81 | —.73 | —.80 |
| abgerundet . . . . | —.73 | —.75 | —.90 | —.75 | —.85 | —.73 | —.80 |
| **Ersparniss** in % ca. | **30** | **21** | **18** | **21** | **10½** | **30** | **23¼** |

---

Statt folgender Ordination:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Zinci sulfurici . . . . 1,0 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae Foeniculi q. s. ad 300,0 „ | —.45 | —.60 | —.60 | —.30 | —.30 | —.45 | —.45 |
| M. D. S. Augenwasser. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | 1.04 | 1.24 | 1.28 | —.81 | 1.01 | 1.04 | 1.10 |
| abgerundet . . . . | 1.04 | 1.20 | 1.25 | —.85 | 1.05 | 1.04 | 1.10 |

ist zu schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Zinci sulfurici . . . . 1,0 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Olei Foeniculi . . . gtt. VI. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aquae destillatae q. s. ad 300,0 gr. | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Augenwasser. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | —.80 | —.85 | —.86 | —.72 | —.89 | —.80 | —.90 |
| abgerundet . . . . | —.80 | —.85 | —.90 | —.75 | —.90 | —.80 | —.90 |
| **Ersparniss** in % ca. | **23** | **29¼** | **28** | **11¾** | **14¼** | **23** | **18¼** |

---

Statt folgender Ordination:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Aquae Menth. pip. . ad 300,0 „ | —.75 | —.60 | —.60 | —.60 | —.45 | —.75 | —.75 |
| M. D. S. Gurgelwasser. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | 1.36 | 1.24 | 1.30 | 1.11 | 1.18 | 1.36 | 1.40 |
| abgerundet . . . . | 1.36 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.36 | 1.40 |

| ist zu schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Ol. Menth. pip. . . . gtt. VI. | —.06 | —.08 | —.12 | —.12 | —.09 | —.06 | —.06 |
| Aquae destillat. q. s. ad 300,0 gr. | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Gurgelwasser. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.35 | —.38 | —.25 | —.25 | —.38 | —.35 | —.35 |
| | —.85 | —.90 | —.97 | —.81 | —.97 | —.85 | —.91 |
| abgerundet . . . . | —.85 | —.90 | 1.— | —.85 | 1.— | —.85 | —.95 |
| **Ersparniss** in % ca. | 37½ | 25 | 30 | 22¾ | 16¾ | 37½ | 32¼ |

Vorstehendes Recept kann noch weiter verbilligt werden durch folgende Schreibweise:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acidi salicylici . . . . 1,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Ol. Menthae pip. . . gtt. VI. | —.06 | —.08 | —.12 | —.12 | —.09 | —.06 | —.06 |
| Spiritus . . . . . . . 50,0 gr. | —.13 | —.20 | —.10 | —.25 | —.18 | —.13 | —.13 |
| M. D. S. 20—30 Tropfen in 1 Glas Wasser zum Gurgeln. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | —.68 | —.80 | —.82 | —.84 | —.85 | —.68 | —.74 |
| abgerundet . . . . | —.68 | —.80 | —.85 | —.85 | —.85 | —.68 | —.75 |
| **Ersparniss** in % ca. | 50 | 33¼ | 34½ | 22¼ | 27½ | 50 | 53½ |

---

## N. Geschmackscorrigentien.

§ 19.

Bei Verordnung von Geschmackscorrigentien dürfte geeignete Beschränkung am Platze sein.

Zum Versüssen der Arzneien genügt Sirupus simplex. Andere Sirupe können leicht in geeigneter Weise ersetzt werden.

| Statt folgender Mixtur: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Sirupi Liquiritiae . . . 30,0 gr. | —.45 | —.45 | —.30 | —.24 | —.30 | —.45 | —.45 |
| Mixturae solventis . . 170,0 „ | | | | | | | |
| (Ammon. chlorati . 4,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquiritiae dep. 2,0 „ | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Aqua destillat. ad 170,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | | —.15 | —.30 | —.15 | —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | —.20 | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.24 | 1.29 | 1.08 | —.86 | —.97 | 1.24 | 1.24 |
| abgerundet . . . . | 1.24 | 1.25 | 1.05 | —.90 | 1.— | 1.24 | 1.24 |

ist zu schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Mixturae solventis . . 200,0 gr. | | | | | | | |
| (Ammon. chlorati . 5,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquiritiae dep. 2,0 „ | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Aquae destill. . ad 200,0 „ ) | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | | —.15 | —.30 | —.15 | —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | —.20 | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.77 | —.82 | —.79 | —.60 | —.68 | —.77 | —.75 |
| abgerundet . . . . | —.77 | —.85 | —.80 | —.60 | —.70 | —.77 | —.75 |
| **Ersparniss** in % ca. | **38** | **32** | **23¼** | **33¼** | **30** | **38** | **37½** |

Statt folgender Mixtur:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammon. hydrochl. . . 5,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aq. destillat. . . . . 185,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| Morph. hydrochl.. . . 0,05 „ | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquirit. dep. q. s. **ad** 200,0 „ | —.20 | —.40 | —.30 | —.15 | —.25 | —.20 | —.20 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.30 | —.15 | —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.93 | 1.20 | 1.06 | —.80 | —.93 | —.93 | —.95 |
| abgerundet . . . . | —.93 | 1.20 | 1.05 | —.80 | —.95 | —.93 | —.95 |

ist zu schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Ammon. hydrochl. . . . 5,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Succi Liquirit. dep. . . 2,0 „ | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Morph. hydrochl. . . . 0,05 „ | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 |
| Aq. destill. q. s. . **ad** 200,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.30 | —.15 | —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.83 | —.90 | —.82 | —.68 | —.73 | —.83 | —.85 |
| abgerundet . . . . | —.83 | —.90 | —.85 | —.70 | —.75 | —.83 | —.85 |
| **Ersparniss** in % ca. | **10¾** | **25** | **19** | **12½** | **21** | **10¾** | **10½** |

Statt folgender Mixtur:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. Solutionis Natrii salicylici | —.20 | —.20 | —.20 | —.24 | —.20 | —.20 | —.20 |
| 4,0 : 170,0 gr. | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| Succi Liquiritiae depurati 5,0 gr. | —.20 | —.25 | —.15 | —.08 | —.13 | —.20 | —.20 |
| Codeini phosphorici . . 0,2 „ | —.30 | —.40 | —.40 | —.40 | —.50 | —.30 | —.30 |
| Sirupi simplicis q. s. ad 200,0 „ | —.13 | —.13 | —.13 | —.13 | —.13 | —.13 | —.13 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | } —.20 | —.15 | | —.15 | —.25 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | | } —.15 | } —.30 | —.15 | } —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.52 | 1.72 | 1.57 | 1.44 | 1.55 | 1.52 | 1.52 |
| abgerundet . . . . | 1.52 | 1.70 | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.52 | 1.50 |

ist zu schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. Natrii salicylici . . . . 4,0 gr. | —.20 | —.20 | —.20 | —.24 | —.20 | —.20 | —.20 |
| Succi Liquiritiae depurati 2,0 „ | —.10 | —.10 | —.06 | —.03 | —.05 | —.10 | —.10 |
| Codeini phosphorici . . 0,2 „ | —.30 | —.40 | —.40 | —.40 | —.50 | —.30 | —.30 |
| Aquae destillatae q. s. ad 200,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | } —.20 | —.12 | | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | | } —.15 | } —.30 | —.15 | } —.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | —.20 | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.27 | 1.42 | 1.36 | 1.24 | 1.35 | 1.27 | 1.25 |
| abgerundet . . . . | 1.27 | 1.40 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.27 | 1.25 |
| **Ersparniss** in % ca. | **16½** | **17¾** | **13** | **14¼** | **13** | **16½** | **16⅔** |

Oder auch:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. Natrii salicylici . . . . 4,0 gr. | —.20 | —.20 | —.20 | —.24 | —.20 | —.20 | —.20 |
| Codeini phosphorici . . 0,2 „ | —.30 | —.40 | —.40 | —.40 | —.50 | —.30 | —.30 |
| Tincturae Aurantii Cort. 1,5 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirupi simplicis . . . . 14,0 „ | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 |
| Aquae destillatae q. s. ad 200,0 „ | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | } —.30 | —.15 | —.25 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.34 | 1.40 | 1.20 | 1.32 |
| abgerundet . . . . | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| **Ersparniss** in % ca. | **21** | **23½** | **9¾** | **9¼** | **9¾** | **21** | **13⅓** |

## O. Ersatz von Sirupus Aurantii Cort.

§ 20.

Bei Ordination von Sirupus Aurantii Cort. in Mengen von 10,0 gr. und darüber empfiehlt es sich, denselben durch eine Mischung aus 1 Theil Tinctura Aurantii Corticis mit 9 Theilen Sirupus simplex zu ersetzen. Bei der grossen Menge von Sirupus Aurantii Cort. (einzelne Aerzte ordiniren bis zu 45,0) ist diese Verbilligung sehr zu beachten.

| Es kosten: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirup. Aurantii Cort. . . . . . 10.0 gr. | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.12 | —.15 | —.15 |
| 1 Wägung . . . . . . . . . | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.— | —.03 | —.05 |
| | —.18 | —.18 | *—.10 | —.15 | *—.12 | —.18 | —.20 |
| **Dagegen:** | | | | | | | |
| Tinctur. Aurantii Cort. . . . 1,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Sirup. simplic. . . . . . . . 9,0 „ | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 | —.05 |
| 2 Wägungen . . . . . . . . | —.06 | —.06 | —.— | —.06 | —.— | —.06 | —.10 |
| | —.14 | —.14 | *—.08 | —.14 | *—.08 | —.14 | —.20 |
| **Ferner:** | | | | | | | |
| Sirup. Aurantii Cort. . . . . 30,0 gr. | —.45 | —.45 | —.30 | —.36 | —.36 | —.45 | —.45 |
| 1 Wägung . . . . . . . . . | —.03 | —.03 | —.— | —.03 | —.— | —.03 | —.05 |
| | —.48 | —.48 | *—.30 | —.39 | *—.36 | —.48 | —.50 |
| **Dagegen:** | | | | | | | |
| Tinctur. Aurantii Cort. . . . 3,0 gr. | —.06 | —.06 | —.03 | —.05 | —.05 | —.06 | —.06 |
| Sirup. simplic. . . . . . . 27,0 „ | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 | —.14 |
| 2 Wägungen . . . . . . . . | —.06 | —.06 | —.— | —.06 | —.— | —.06 | —.10 |
| | —.26 | —.26 | *—.17 | —.25 | *—.19 | —.26 | —.30 |

* Ausschliesslich der Wägungen bezw. Mischungen, da die Arbeitslöhne für das Abwägen in der Grundtaxe bezw. Pauschalsumme enthalten sind.

---

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Natrii salicyl. . . . . . . 5,0 gr. | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Sirup. Aurantii Cort. . . 20,0 „ | —.30 | —.30 | —.20 | —.24 | —.24 | —.30 | —.30 |
| Aq. destillat. . . . ad 200,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.14 |
| abgerundet . . . . . | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Natrii salicyl. . . . . . 5,0 gr. | —.25 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.25 |
| Tinct. Aurantii Cort. . . 2,0 „ | —.04 | —.04 | —.03 | —.03 | —.03 | —.04 | —.05 |
| Sirup. simpl. . . . . . 18,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| Aq. destillat. . . . ad 200,0 „ | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | }—.30 | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . . | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 | —.20 |
| | —.94 | —.94 | 1.06 | —.96 | —.96 | —.94 | 1.03 |
| abgerundet . . . . . | —.94 | —.95 | 1.05 | 1.— | 1.— | —.94 | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | 13 | $9\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | $4\frac{3}{4}$ | 9 | 13 | 9 |

## P. Sonstige Sirupe.

§ 21.

Der von vielen Aerzten beliebte Zusatz von Sirup. Ipecacuanh. zu einem Infus. Ipecacuanh. oder von Sirup. Rhei zu einem Infus. Rhei oder von Sirup. Senegae ist zu vermeiden.

Durch eine erhöhte Dosis der betreffenden Species bei Herstellung des Infusums oder Dekoktes kann die durch Zusatz des Sirups beabsichtigte verstärkte therapeutische Wirkung einfach, sicher wirkend und billig erreicht werden.

---

## Q. Elixir e succo Liquiritiae.

§ 22.

Bei den eigenartigen Grundsätzen der Taxen **c**) und **e**) (Berechnung von Mixturen unter Annahme eines Pauschalbetrages) empfiehlt es sich, bei Bedarf von Elixir e succo Liquiritiae solches aus seinen einzelnen Bestandtheilen zu verordnen, wenn in der betreffenden Arzneiform (Mixtur, Saft, Tropfen u. s. w.) ohnedies bereits eine Salz- oder Extraktlösung vorkommt.

| Z. B. kostet folgende Ordination: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morph. hydrochl. . . . . 0,06 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Liq. Ammon. anis. . . . 2,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Aq. Amydal. am. . . 15,0 „ | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 |
| Elix. e succo Liq. . . 20,0 „ | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 |
| M. D. S. Dreistündlich 20 Tropfen. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | }—.20 | —.12 | }—.30 | —.12 | —.20 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes Glas . . . . . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.13 |
| abgerundet . . . . | 1.01 | 1.— | 1.05 | 1.— | 1.10 | 1.01 | 1.10 |

Dagegen kostet folgende Ordination:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Morph. hydrochl. . . 0.06 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.06 | —.03 | —.05 |
| Liq. Ammon. anis. . . 6,0 „ | —.06 | —.06 | —.06 | —.08 | —.06 | —.06 | —.06 |
| Aq. Amygdal. am. . . 15,0 „ | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 | —.23 |
| Succ. Liquirit. dep. . 4.0 „ | —.20 | —.20 | —.12 | —.06 | —.10 | —.20 | —.20 |
| Aq. Foenicul. . . . . . 12,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 |
| M. D. S. Dreistündlich 20 Tropfen zu nehmen. | | | | | | | |
| 5 Wägungen . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | }—.30 | —.15 | —.25 |
| 1 Salzlösung . . . . . . | —.15 | —.15 | }—.20 | }—.15 | | —.15 | }—.15 |
| 1 Extraktlösung . . . . | —.10 | —.15 | | | | —.10 | |
| 1 grünes Glas . . . . . . | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | 1.10 | 1.17 | —.97 | —.90 | —.93 | 1.10 | 1.12 |
| abgerundet . . . . . . | 1.10 | 1.15 | 1.— | —.90 | —.95 | 1.10 | 1.10 |
| **Ersparniss** in % ca. | — | — | 4¾ | 10 | 13¾ | — | — |
| **Mehrkosten** in % ca. | 9 | 15 | — | — | — | 9 | — |

Während also nach den Taxen **c**), **d**) und **e**) eine Ersparniss erzielt wird, tritt nach den Taxen **a**), **b**) und **f**) eine Steigerung des Preises ein; nach Taxe **g**) bleibt der Preis ungeändert; es dürfen also nur die Aerzte in Württemberg, Sachsen und Hessen die vorgeschlagene Schreibweise anwenden.

---

## R. Spiritus e Vino.

### § 23.

Bei dem sehr hohen Arznei-Taxpreise des Cognacs — 10 Gramm 20 Pf., 100 Gramm Mk. 1.50 — dürfte es sich empfehlen, im Bedarfsfalle andere spirituöse Arzneimittel, z. B. Ungarwein, Portwein oder spirituöse Mixturen zu verordnen.

| Z. B. kostet folgende Ordination: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Spiritus e Vino Cognac 100,0 gr. D. S. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll. | 1.50 | 2.— | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| 1 Wägung | —.03 | —.03 | —.10 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| 1 grünes Glas | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | 1.68 | 2.18 | 1.70 | 1.68 | 1.48 | 1.68 | 1.70 |
| abgerundet | 1.68 | 2.15 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.68 | 1.70 |

Dagegen kostet folgende Ordination:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Tinct. am. vel Aur. Cort. 1,0 gr. | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Tincturae aromaticae 1,0 „ | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Spiritus | —.04 | —.06 | —.03 | —.07 | —.06 | —.04 | —.05 |
| Sirupi simplicis ää 13,0 gr. | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 | —.07 |
| Aquae destillatae q. s. **ad** 100,0 „ | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.05 |
| M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll. | | | | | | | |
| 5 Wägungen | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.10 | —.15 | —.25 |
| 1 grünes Glas | —.15 | —.15 | —.10 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.51 | —.53 | —.50 | —.54 | —.48 | —.51 | —.67 |
| abgerundet | —.51 | —.55 | —.50 | —.55 | —.50 | —.51 | —.70 |
| **Ersparniss** in % ca. | **70** | **70** | **70** | **66¾** | **66¾** | **70** | **41¼** |

### § 24.

Für äusserliche Zwecke, zum Einreiben, als Lösungsmittel für Naphtalin, Thymol und ähnliche Mittel, dürfte die Ordination von Spiritus und Aqua destillata an Stelle des theuren Spiritus e Vino wohl vollständig genügen.

Zur schnelleren Uebersicht der Preise der einzelnen Lösungsmittel dient die nachfolgende

# Zusammenstellung.

| Es kosten: | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiritus (90%) | 50,0 gr. | —.16 | —.23 | —.10 | —.28 | —.18 | —.16 | —.18 |
| | 100,0 „ | —.28 | —.43 | —.20 | —.33 | —.35 | —.28 | —.30 |
| | 150,0 „ | —.41 | —.63 | —.30 | —.48 | —.50 | —.41 | —.43 |
| | 200,0 „ | —.43 | —.83 | —.40 | —.63 | —.50 | —.43 | —.45 |
| Mischung aus gleichen Theilen Spiritus (90%) und destill. Wasser | 50,0 „ | —.16 | —.19 | —.08 | —.22 | —.12 | —.16 | —.22 |
| | 100,0 „ | —.22 | —.29 | —.13 | —.34 | —.21 | —.22 | —.28 |
| | 150,0 „ | —.29 | —.40 | —.19 | —.40 | —.30 | —.29 | —.34 |
| | 200,0 „ | —.36 | —.51 | —.25 | —.41 | —.38 | —.36 | —.40 |
| Spiritus dilutus (69%) | 50,0 „ | —.23 | —.18 | —.08 | —.23 | —.13 | —.23 | —.15 |
| | 100,0 „ | —.43 | —.33 | —.15 | —.28 | —.25 | —.43 | —.25 |
| | 150,0 „ | —.63 | —.48 | —.23 | —.41 | —.38 | —.63 | —.35 |
| | 200,0 „ | —.63 | —.63 | —.30 | —.53 | —.40 | —.63 | —.35 |
| Spiritus e Vino Cognac | 50,0 „ | 1.03 | 1.28 | —.75 | 1.03 | —.65 | 1.03 | 1.05 |
| | 100,0 „ | 1.53 | 2.03 | 1.50 | 1.53 | 1.30 | 1.53 | 1.55 |
| | 150,0 „ | 2.28 | 3.03 | 2.25 | 2.28 | 1.95 | 2.28 | 2.30 |
| | 200,0 „ | 3.03 | 4.03 | 3.— | 3.03 | 2.— | 3.03 | 3.05 |

Die vorstehenden Preise sind bei den Taxen **a**), **b**), **d**), **f**) und **g**) einschliesslich, bei den Taxen **c**) und **e**) ausschliesslich des Arbeitslohnes für die Wägungen.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Thymoli 2,0 gr. | —.20 | —.20 | —.30 | —.24 | —.30 | —.20 | —.20 |
| Spiritus e Vino Cognac 150,0 „ | 2.25 | 3.— | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.25 | 2.25 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen | —.06 | —.06 | } —.20 | —.06 | } —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung | —.15 | —.15 | } —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| | 2.91 | 3.71 | 3.20 | 2.95 | 2.85 | 2.91 | 2.95 |
| abgerundet | 2.91 | 3.70 | 3.20 | 2.95 | 2.85 | 2.91 | 2.95 |

sondern statt dessen:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Thymoli 2,0 gr. | —.20 | —.20 | —.30 | —.24 | —.30 | —.20 | —.20 |
| Spiritus | —.19 | —.30 | —.15 | —.30 | —.27 | —.19 | —.19 |
| Aquae destillatae āā 75,0 gr. | —.04 | —.04 | —.03 | —.03 | —.04 | —.04 | —.05 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 3 Wägungen | —.09 | —.09 | } —.20 | —.09 | —.09 | —.09 | —.15 |
| 1 Lösung | —.15 | —.15 | } —.20 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| | —.92 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.15 | —.92 | —.99 |
| abgerundet | —.92 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | —.92 | 1.— |
| **Ersparniss** in % ca. | $68\frac{3}{4}$ | $71\frac{3}{4}$ | $65\frac{1}{2}$ | $64\frac{1}{2}$ | $59\frac{1}{2}$ | $68\frac{3}{4}$ | 66 |

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Naphtalini . . . . . . 5,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Spiritus e Vino Cognac 150,0 „ | 2.25 | 3.— | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.25 | 2.25 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | }—.20 | —.06 | }—.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| | 2.76 | 3.56 | 2.95 | 2.74 | 2.60 | 2.76 | 2.80 |
| abgerundet . . . . | 2.76 | 3.55 | 2.95 | 2.70 | 2.60 | 2.76 | 2.80 |

sondern der Arzt **muss** schreiben:

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Naphtalini . . . . . . 5,0 gr. | —.05 | —.05 | —.05 | —.03 | —.05 | —.05 | —.05 |
| Spiritus . . . . . . . . . . | —.19 | —.30 | —.15 | —.30 | —.27 | —.19 | —.19 |
| Aquae destillatae . . āā 75,0 gr. | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.04 | —.05 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | }—.20 | —.09 | }—.30 | —.09 | —.15 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 grünes 6eckiges Glas . | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 | —.30 | —.25 | —.25 |
| | —.77 | —.93 | —.89 | —.86 | —.96 | —.77 | —.84 |
| abgerundet . . . . | —.77 | —.95 | —.90 | —.90 | 1.— | —.77 | —.85 |
| **Ersparniss** in % ca. | **72** | **73¼** | **69½** | **66¾** | **61½** | **72** | **69¾** |

## S. Ersatz von Oleum Olivarum.

§ 25.

Zu äusserlichen Zwecken, Einreibungen, Mischungen mit Styrax u. s. w. empfiehlt sich an Stelle des theuren Oleum Olivarum die Verwendung von billigerem Oleum Olivarum commune oder Oleum Papaveris oder Oleum Raparum.

| Es kosten (ausschliesslich der Wägung): | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleum Olivarum . . . . . . 10,0 gr. | —.10 | —.06 | —.06 | —.08 | —.06 | —.10 | —.10 |
| „ „ . . . . . . 100,0 „ | —.60 | —.60 | —.60 | —.50 | —.60 | —.60 | —.60 |
| „ „ . . . . . . 200,0 „ | —.90 | 1.20 | 1.20 | 1.— | 1.20 | —.90 | —.90 |
| „ „ comm. . . 10,0 „ | —.05 | —.04 | —.03 | —.— | —.— | —.05 | —.05 |
| „ „ „ . . . 100,0 „ | —.45 | —.40 | —.30 | —.35 | —.35 | —.45 | —.45 |
| „ „ „ . . . 200,0 „ | —.70 | —.80 | —.60 | —.70 | —.70 | —.70 | —.70 |
| „ Papaveris . . . . . 10,0 „ | —.05 | —.05 | —.04 | —.05 | —.— | —.05 | —.05 |
| „ „ . . . . . 100,0 „ | —.50 | —.40 | —.40 | —.40 | —.45 | —.50 | —.50 |
| „ „ . . . . . 200,0 „ | 1.— | —.80 | —.80 | —.80 | —.90 | 1.— | 1.— |
| „ Rapae . . . . . . 10,0 „ | —.04 | —.— | —.03 | —.— | —.— | —.04 | —.04 |
| „ „ . . . . . . 100,0 „ | —.40 | —.— | —.30 | —.— | —.25 | —.40 | —.40 |
| „ „ . . . . . . 200,0 „ | —.80 | —.— | —.60 | —.— | —.50 | —.80 | —.80 |

Bei Ordination des billigeren Oleum Olivarum darf der Arzt den Zusatz **commune** nicht vergessen.

Auf die vorstehenden Preise muss der Arzt besonders bei Verordnung von Liniment. ammoniatum und Liniment. ammoniato-camphoratum achten.

Wenn auch die beiden genannten Arzneimittel in unvermischtem Zustande als Handverkaufsartikel bedeutend billiger als nach den officinellen Arzneitaxen abgegeben werden, so wird bei Verordnung von Mischungen, in welche diese Arzneimittel eingehen, der volle Taxpreis derselben berechnet; es muss also der Arzt bei Mengen von 30 Gramm und mehr die einzelnen Stoffe verordnen.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Liniment. volat. . . . . 90,0 gr. | —.70 | —.80 | —.80 | —.60 | —.70 | —.70 | —.70 |
| Tinct. Cantharid. . . . 10,0 „ | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.15 |
| M. D. S. Zum Einreiben. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 | —.06 | —.10 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | 1.11 | 1.24 | 1.30 | —.99 | 1.23 | 1.11 | 1.15 |
| abgerundet . . . . | 1.11 | 1.20 | 1.30 | 1.— | 1.25 | 1.11 | 1.15 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Tinct. Cantharid. . . . 10,0 gr. | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.15 |
| Ol. Rapae . . . . . . . 72,0 „ | —.29 | * —.29 | —.22 | * —.26 | —.18 | —.29 | —.29 |
| Liqu. Ammon. caust. . . 18,0 „ | —.09 | —.06 | —.04 | —.06 | —.09 | —.09 | —.09 |
| M. D. S. Zum Einreiben. | | | | | | | |
| 3 Wägungen . . . . . . | —.09 | —.09 | —.20 | —.09 | —.10 | —.09 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | —.82 | * —.82 | —.76 | * —.74 | —.80 | —.82 | —.88 |
| abgerundet . . . . | —.82 | —.85 | —.80 | —.75 | —.80 | —.82 | —.90 |
| **Ersparniss** in % ca. | **26¼** | **29¼** | **38½** | **25** | **36** | **26¼** | **21¾** |

* Mit Ol. Olivar. **commune** bereitet.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Liniment. ammoniat. camphor. 80,0 gr. | —.80 | 1.20 | —.80 | —.80 | —.90 | —.80 | —.80 |
| Chloroform . . . . . . . 20,0 „ | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 | —.06 | —.10 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | 1.36 | 1.79 | 1.45 | 1.34 | 1.53 | 1.36 | 1.40 |
| abgerundet . . . . | 1.36 | 1.75 | 1.45 | 1.30 | 1.55 | 1.36 | 1.40 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Chloroform . . . . . . . 20,0 gr. | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 | —.30 |
| Oleum Rapae . . . . . 48,0 „ | —.20 | * —.20 | —.15 | * —.17 | —.12 | —.20 | —.20 |
| Oleum camphorat. . . . . . . . | —.16 | —.24 | —.16 | —.16 | —.16 | —.16 | —.16 |
| Liq. Ammon. caust. ää 16,0 gr. | —.08 | —.05 | —.04 | —.05 | —.08 | —.08 | —.08 |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| 4 Wägungen . . . . . . | —.12 | —.12 | —.20 | —.12 | —.10 | —.12 | —.20 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.20 | —.23 | —.15 | —.18 | —.23 | —.20 | —.20 |
| | 1.06 | * 1.14 | 1.— | * —.98 | —.99 | 1.06 | 1.14 |
| abgerundet . . . . | 1.06 | 1.10 | 1.— | 1.— | 1.— | 1.06 | 1.10 |
| **Ersparniss** in % ca. | **22** | **37** | **31** | **23** | **35½** | **22** | **21½** |

* Mit Ol. Olivar. **commune** bereitet.

## T. Salben.

§ 25.

Abgesehen von der oben unter C, § 8, Seite 23 gegebenen Anleitung über Ersparnisse an den bei Salben zur Verwendung gelangenden Töpfen sei hier noch auf die Salbengrundlagen aufmerksam gemacht.

Bestimmte Vorschriften über die Verwendung der einen oder anderen Salbengrundlage können nicht gegeben werden, sondern es muss dem behandelnden Arzte die Entscheidung überlassen bleiben, welche Salbengrundlage er im einzelnen vorliegenden Falle für die geeignetste erachtet. Betreffs des Preises diene nachfolgende

### Zusammenstellung.

| Es kosten (ausschliesslich der Wägungen): | | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeps benzoatus | 10 gr. | —.15 | —.15 | —.10 | —.12 | —.10 | —.15 | —.15 |
| " " | 100 " | 1.— | 1.20 | —.80 | —.96 | —.80 | 1.— | 1.— |
| " suillus | 10 " | —.10 | —.08 | —.05 | —.08 | —.05 | —.10 | —.10 |
| " " | 100 " | —.60 | —.80 | —.50 | —.50 | —.40 | —.60 | —.60 |
| Lanolinum | 10 " | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | —.15 |
| " | 100 " | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.30 |
| Mollinum | 10 " | —.— | —.15 | —.10 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| " | 100 " | —.— | 1.20 | —.80 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| Sapo kalinus | 10 " | —.05 | —.05 | —.04 | —.04 | —.05 | —.05 | —.05 |
| " " | 100 " | —.35 | —.50 | —.40 | —.40 | —.40 | —.35 | —.35 |
| " " venalis | 100 " | —.30 | —.25 | —.20 | —.20 | —.15 | —.30 | —.30 |
| Unguentum Paraffini | 10 " | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 | —.10 |
| " " | 100 " | —.85 | —.80 | —.80 | —.80 | —.80 | —.85 | —.85 |
| Vaselinum flavum Americanum | 10 " | —.10 | —.15 | —.— | —.10 | —.— | —.10 | —.10 |
| " " " | 100 " | —.80 | 1.20 | —.— | —.80 | —.— | —.80 | —.85 |
| " " Germanicum | 10 " | —.— | —.— | —.— | —.06 | —.— | —.— | —.— |
| " " " | 100 " | —.— | —.— | —.— | —.60 | —.— | —.— | —.— |

## U. Verordnung von Acidum carbolicum.

§ 26.

Die Verordnung von Acidum carbolicum und Aqua carbolisata erheischt seitens des ordinirenden Arztes die grösste Aufmerksamkeit.

Schreibt der Arzt bei seinen Ordinationen einfach Acidum carbolicum, so wird von dem Apotheker stets die officinelle Acidum carbolicum (**cristallisatum**) berechnet.

Im Falle die Acidum carbolicum zu flüssigen Arzneien verordnet und verwendet ist, so wird noch der Arbeitspreis für eine Lösung in Ansatz gebracht, während bei Verordnungen der Acidum carbolicum zu Pillen, Salben u. s. w. die Ordinationen durch den dem Apotheker erlaubten und freistehenden Zusatz von Aqu. destill. oder Spirit. oder sonst geeignetem Mittel und das Abwägen dieses Zusatzes vertheuert werden.

Mit Ausnahme von Lösungen der Acidum carbolicum in fetten Oelen soll der Arzt zur Ersparniss von unnützen Kosten stets bei allen Ordinationen von Mixturen, Lösungen, Pillen, Salben u. s. w. nur die ebenfalls officinelle Acidum carbolicum liquefactum oder liquidum verordnen, welche 90% Acidum carbolicum cristallisatum enthält; er muss aber darauf achten, dass er das Wort **liquefactum** oder **liquidum** stets zusetzt.

| Der Arzt darf **nicht** schreiben: | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rp.** Acid. carbol. . . . . . 0,6 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Glycerini . . q. s. ad. 15,0 „ | —.08 | —.08 | —.06 | —.09 | —.08 | —.08 | —.08 |
| D. S. Ohrentropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.30 | —.06 | —.10 |
| 1 Lösung . . . . . . . | —.15 | —.15 | —.20 | —.15 | | —.15 | —.15 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.47 | —.49 | —.64 | —.50 | —.56 | —.47 | —.53 |
| abgerundet . . . . | —.47 | —.50 | —.65 | —.50 | —.60 | —.47 | —.55 |
| sondern der Arzt **muss** schreiben: | | | | | | | |
| **Rp.** Acid. carbolic. liquid. . . 0,7 gr. | —.03 | —.05 | —.03 | —.05 | —.03 | —.03 | —.05 |
| Glycerin . . . q. s. ad 15,0 „ | —.08 | —.08 | —.06 | —.09 | —.08 | —.08 | —.08 |
| D. S. Ohrentropfen. | | | | | | | |
| 2 Wägungen . . . . . . | —.06 | —.06 | —.20 | —.06 | —.10 | —.06 | —.10 |
| 1 6eckiges Glas . . . . | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 | —.15 |
| | —.32 | —.34 | —.44 | —.35 | —.36 | —.32 | —.38 |
| abgerundet . . . . | —.32 | —.35 | —.45 | —.35 | —.40 | —.32 | —.40 |
| **Ersparniss** in % ca. | **32** | **30** | **30¹/₄** | **30** | **33¹/₄** | **32** | **27¹/₄** |

§ 27.

Es sei hier noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass Karbolwasser (Aqua carbolisata) und Karbolöl (Oleum carbolisatum) in verschiedenen Stärken als Handverkaufsartikel zu ermässigten Preisen abgegeben werden und hat der behandelnde Arzt einfach nur die Menge und den Prozentgehalt des von ihm gewünschten Mittels anzugeben.

---

## V. Magistralformeln.

§ 28.

Die Verabredung und Verordnung von Magistralformeln ist gestattet und zweckmässig; aber dieselben müssen durch den Arzt anerkannt werden, oder der Apotheker muss entsprechend den Taxbestimmungen auf jedem einzelnen Recepte die nöthigen Angaben machen.

Straffällig ist die Verabredung von Chiffre-Schrift zwischen Arzt und Apotheker.

§ 29.

Zusätze zu den Magistralformeln sind in der Weise zu machen, dass zuerst der Zusatz, dann die Magistralformel **ad dosin** verordnet wird.

---

## W. Leere Gefässe.

§ 30.

Es ist streng darauf zu achten, dass die leeren Gefässe im gereinigten Zustande sowohl bei Wiederholungen als auch bei Neuverordnungen bei dem Abgeben des Receptes mit in die Apotheke gebracht werden.

Der Arzt muss bei der Ordination darauf achten und auf dem Recepte sine vitro (olla, scatula) oder ad vitrum (ollam, scatulam) remissum bemerken, da in diesem Falle nur der halbe Taxpreis in Ansatz gebracht werden darf. Bei dem Handverkauf darf überhaupt nichts berechnet werden, wenn leere Gefässe zur Aufnahme der betreffenden Arzneimittel in die Apotheke mitgebracht werden.

---

## X. Verschiedenes.

Zur Vermeidung unnöthig hoher Arzneikosten sind ferner folgende Anweisungen sorgfältig zu beachten.

§ 31.

Auf die Handverkaufstaxen ist genau zu achten und von denselben in ausgiebigster Weise Gebrauch zu machen. Die darin enthaltenen Gewichtsmengen für Arzneistoffe sind als Dosis parva, Dosis magna, Dosis maxima zu verordnen; die Angabe der Gewichtsmenge ist bei dieser Verordnungsweise nicht erforderlich.

Die in der Handverkaufstaxe aufgeführten Arzneistoffe müssen stets ungemischt verordnet werden, damit dieselben zu den ermässigten Preisen berechnet werden.

§ 32.

Bei allen Arzneiverordnungen, auch von Handverkaufsartikeln, hat der Arzt eine genaue Gebrauchsanweisung als Signatur anzugeben und tritt durch das Hinzufügen einer Signatur bei den Handverkaufsartikeln keine Preiserhöhung ein.

§ 33.

Bei in Wasser löslichen Salzen, z. B. Acid. boric., Kal. chloric., Kal. bromat., Kal. jodat. etc. empfiehlt es sich, das zu gebrauchende Quantum des betreffenden Arzneistoffes zum ersten Male in Lösung zu verordnen, im Wiederholungsfalle dagegen allein als Substanz. Das Auflösen, am besten in gekochtem Wasser, bleibt alsdann dem verständigen Kranken nach Anweisung des Arztes selbst überlassen. Das in Händen befindliche Gefäss dient als Maass.

§ 34.

Zu Bandwurmkuren sind die in der Handverkaufstaxe aufgeführten Capsulae Extr. Filicis und Kosotabletten zu verwenden. Extr. Filicis lose oder in Mixturen ist wegen des hohen Preises zu vermeiden.

Decoct. cort. rad. Granati kann sich der Patient leicht selbst bereiten.

§ 35.

Der Kurgebrauch von natürlichen Brunnen ist thunlichst, von natürlichen Brunnensalzen unter allen Umständen zu vermeiden und durch die Verwendung entsprechender künstlicher Brunnensalze zu ersetzen.

Bade-Ingredienzen (Badesalze, Eichenrinde u. s. w.) sollen gewöhnlich nur für 3 Bäder ausreichend auf einmal verordnet werden.

§ 36.

Bei allen Verordnungen sind genau die Beschaffenheit, die Mengen (ob Dosis parva, magna, maxima) oder Dimensionen (Länge und Breite der gewünschten Arzneimittel oder Verbandstoffe) anzugeben.

Allgemeine, unbestimmte Ausdrücke, wie 1 Flasche, 1 Päckchen, 1 Binde ohne weitere Bezeichnung sind unzulässig.

Diese genaue Bezeichnung der nöthigen Mengen ist vor Allem bei der Verordnung von Verbandmitteln im Auge zu behalten.

Handverkaufsartikel, welche nicht in den Handverkaufstaxen angegeben sind, werden am besten „nach Geld“ verordnet; man verordne also nicht Unguent. exsiccant. 30,0, sondern für „30 Pfennige“ Unguent. exsiccant.

# 2. Formulae magistrales.

Zusätze zu den Magistralformeln sind in der Weise zu machen, dass zuerst der Zusatz, dann die Magistralformel **ad dosin** verordnet wird.

Bemerkung. Bei der Verschiedenheit der nach den einzelnen Taxen gültigen Bestimmungen über Berechnung der zurückgebrachten Gefässe und der zu erfolgenden Abrundung ist bei den Preisen der nachstehenden Magistralformeln keinerlei Preis für Gefäss berechnet und keinerlei Abrundung vorgenommen. Es muss vielmehr entsprechend den Bestimmungen der einzelnen Taxen noch der Taxpreis des verwendeten Gefässes zugerechnet und bei den Taxen **b**), **c**), **d**), **e**) und **g**) abgerundet werden.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decoctum Chinae.** | | | | | | | |
| **Rp.** Decocti corticis Chinae . 10,0:170,0 | | | | | | | |
| Acidi hydrochlorici diluti 1,0 | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.67 | —.77 | —.88 | —.62 | —.88 | —.67 | —.84 |
| ½ Dosis | —.53 | —.60 | —.71 | —.48 | —.71 | —.53 | —.66 |
| **Decoctum Condurango.** | | | | | | | |
| **Rp.** Decocti corticis Condurango . . . . . . . 15,0:180,0 | | | | | | | |
| Acidi hydrochlorici diluti 1,0 | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Dreimal tägl. 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.62 | —.67 | —.78 | —.75 | —.86 | —.62 | —.84 |
| ½ Dosis | —.50 | —.55 | —.66 | —.54 | —.70 | —.50 | —.66 |
| **Decoctum Senegae.** | | | | | | | |
| **Rp.** Decocti radicis Senegae 10,0:175,0 | | | | | | | |
| Liquoris Ammonii anisati 5,0 | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.74 | —.79 | —.90 | —.85 | —.90 | —.74 | —.89 |
| ½ Dosis | —.55 | —.60 | —.71 | —.57 | —.71 | —.55 | —.68 |
| **Emulsio Amygdalarum.** | | | | | | | |
| **Rp.** Emulsionis Amygdalarum dulcium . . . . . 18,0:180,0 | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.68 | —.59 | —.68 | —.65 | —.78 | —.68 | —.63 |
| ½ Dosis | —.50 | —.45 | —.54 | —.49 | —.64 | —.50 | —.49 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Emulsio communis seu Papaveris.** | | | | | | | |
| **Rp.** Emulsion.sem.Papaveris 20,0:185,0<br>Sirupi simplicis . . . ad 200,0<br>M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.59 | —.43 | —.54 | —.65 | —.64 | —.59 | —.63 |
| ½ Dosis | —.45 | —.34 | —.47 | —.48 | —.57 | —.45 | —.50 |
| **Emulsio ricinosa.** | | | | | | | |
| **Rp.** Ol. Ricini. . . . . . . . . . 40,0<br>Gummi arab. pulv. . . . . 12,0<br>Sirupi simplicis . . . . . . 20,0<br>Aqu. destillat.. . . . ad 200,0<br>M. f. l. a. emulsio. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.07 | 1.34 | 1.— | 1.07 | 1.16 | 1.07 | 1.13 |
| ½ Dosis | —.83 | —.86 | —.70 | —.71 | —.83 | —.83 | —.90 |
| **Guttae antasthmaticae.** | | | | | | | |
| **Rp.** Liquoris Ammonii anisati<br>Tincturae Opii simplicis<br>" Stramonii . . āā 10,0<br>M. D. S. Dreistündlich 15 Tropfen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.54 | —.69 | —.75 | —.61 | —.75 | —.54 | —.60 |
| ½ Dosis | —.42 | —.44 | —.48 | —.45 | —.45 | —.42 | —.48 |
| **Infusum Ipecacuanhae seu expectorans.** | | | | | | | |
| **Rp.** Infusi radic. Ipecac. . . 0,5:175,0<br>Liqu. Ammon. anis. . . . . 5,0<br>Sir. simpl. . . . . . ad 200,0<br>M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.54 | —.59 | —.70 | —.60 | —.68 | —.54 | —.69 |
| ½ Dosis | —.45 | —.50 | —.61 | —.47 | —.61 | —.45 | —.60 |
| **Infusum laxans.** | | | | | | | |
| **Rp.** Infusi folior. Sennae ost-indic. conc. . . . . 15,0:155,0<br>Magnes. sulfur. . . . . . 45,0<br>M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.74 | —.71 | —.80 | —.71 | —.69 | —.74 | —.78 |
| ½ Dosis | —.61 | —.62 | —.71 | —.57 | —.60 | —.61 | —.68 |
| **Infusum Rhei.** | | | | | | | |
| **Rp.** Infusi radic. Rhei. . . 8,0:175,0<br>Natr. bicarb. . . . . . . . 10,0<br>Ol. Menthae pip. . . . gtt. III.<br>Sir. simpl. . . . . . ad 200,0<br>D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.92 | 1.12 | 1.20 | 1.— | 1.— | —.92 | 1.11 |
| ½ Dosis | —.74 | —.87 | —.91 | —.74 | —.76 | —.74 | —.92 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Injectio Bismuti.** | | | | | | | |
| **Rp.** Bismuti subnitrici . . . . . 5,0<br>Aquae destillatae . . . ad 200,0<br>M. D. S. Gut umgeschüttelt äusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.51 | —.61 | 1.— | —.56 | —.90 | —.51 | —.55 |
| 1/2 Dosis | —.34 | —.41 | —.70 | —.39 | —.60 | —.34 | —.40 |
| **Injectio composita.** | | | | | | | |
| **Rp.** Zinc. sulfur.<br>Plumb. acet. . . . . . . āā 1,0<br>Aquae destillatae . . . ad 200,0<br>D. S. Umgeschüttelt, äusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.40 | —.44 | —.56 | —.44 | —.46 | —.40 | —.50 |
| 1/2 Dosis | —.35 | —.39 | —.51 | —.39 | —.41 | —.35 | —.45 |
| **Injectio mitis.** | | | | | | | |
| **Rp.** Solutionis Zinci sulfo-carbolici<br>0,5 ad 200,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.34 | —.36 | —.53 | —.36 | —.43 | —.34 | —.40 |
| 1/2 Dosis | —.29 | —.31 | —.48 | —.31 | —.38 | —.29 | —.35 |
| **Injectio simplex.** | | | | | | | |
| **Rp.** Solutionis Zinci sulfurici<br>0,5 ad 200,0<br>D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.34 | —.36 | —.53 | —.36 | —.43 | —.34 | —.40 |
| 1/2 Dosis | —.29 | —.31 | —.48 | —.31 | —.38 | —.29 | —.35 |
| **Jodoform-Collodium.** | | | | | | | |
| **Rp.** Jodoform. . . . . . . . . 1,5<br>Collod. elast. . . . . ad 15,0<br>D. S. Aeusserlich zum Pinseln. | | | | | | | |
| Dosis . | —.50 | —.58 | —.72 | —.53 | —.67 | —.50 | —.54 |
| 1/2 Dosis | —.36 | —.40 | —.56 | —.37 | —.49 | —.36 | —.40 |
| **Jodoformium desodoratum.** | | | | | | | |
| **Rp.** Ol. Ligni Sassafras . . . gtt. II.<br>Jodoform. . . . . . . . ad 10,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.99 | 1.44 | 1.43 | 1.09 | 1.43 | —.99 | 1.10 |
| 1/2 Dosis | —.69 | —.99 | —.83 | —.79 | —.48 | —.69 | —.80 |
| **Linimentum ammoniato-camphoratum.** | | | | | | | |
| **Rp.** Ol. camphorati . . . . . . 20,0<br>Ol. Rapae . . . . . . . . 60,0<br>Liqu. Ammonii caustic. . . 20,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.63 | * —.69 | —.62 | * —.56 | —.55 | —.63 | —.69 |
| 1/2 Dosis | —.36 | * —.39 | —.42 | * —.33 | —.33 | —.36 | —.42 |

* c. Ol. Olivar. commun.

### Linimentum ammoniatum seu volatile.

Rp. Ol. Rapae . . . . . . . . . 80,0
Liqu. Ammon. caust. . . . 20,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.48 | *—.44 | —.48 | *—.40 | —.40 | —.48 | —.52 |
| ½ Dosis | —.27 | *—.25 | —.35 | *—.23 | —.25 | —.27 | —.31 |

* c. Ol. Olivar. commun.

Die vorstehenden beiden Linimenta werden im unvermischten Zustande ohne andere Zusätze als Handverkaufs-Artikel berechnet; es darf daher von vorstehenden Formeln nur im Falle der Mischung mit anderen Zusätzen Gebrauch gemacht werden.

### Linimentum Chloroformii.

Rp. Chloroformii . . . . . . . . 20,0
Linimenti ammoniati . . . 80,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.73 | *—.70 | —.74 | *—.67 | —.64 | —.73 | —.79 |
| ½ Dosis | —.41 | *—.40 | —.48 | *—.39 | —.37 | —.41 | —.48 |

* c. Ol. Olivar. commun.

### Linimentum contra Combustiones.

Rp. Aquae Calcariae.
Ol. Lini . . . . . . . āā 100,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.46 | —.41 | —.50 | —.37 | —.55 | —.46 | —.50 |
| ½ Dosis | —.36 | —.24 | —.36 | —.22 | —.33 | —.36 | —.40 |

### Linimentum Styracis.

Rp. Styrac. liquid. . . . . . . . 50,0
Spiritus.
Ol. Lini . . . . . . . . āā 25,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | 1.04 | 1.02 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.04 | 1.10 |
| ½ Dosis | —.58 | —.56 | —.77 | —.83 | —.70 | —.58 | —.65 |

### Liquor pectoralis.

Rp. Liquoris Ammonii anisati . . 5,0
Sirupi Althaeae . . . . . . 30,0
Aquae destillatae . . . ad 200,0

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.38 | —.41 | —.49 | —.39 | —.54 | —.38 | —.44 |
| ½ Dosis | —.25 | —.26 | —.36 | —.25 | —.33 | —.25 | —.33 |

### Maceratio Althaeae.

Muss in Bayern als Inf. frigide paratum, in Württemberg als Mucilago Althaeae verordnet werden.

Rp. Macerat. rad. Althaeae 15,0:178,0
Acidi hydrochlorici diluti . . 2,0
Sirupi simplicis . . . ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.64 | —.58 | —.61 | —.60 | —.69 | —.62 | —.74 |
| ½ Dosis | —.48 | —.49 | —.52 | —.46 | —.61 | —.46 | —.58 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mixtura Acidi hydrochlorici.** | | | | | | | |
| Rp. Acidi hydrochlorici diluti . . 2,0 | | | | | | | |
| Tinct. Aurantii cort. . . . 5,0 | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . . . . 20,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.44 | —.44 | —.47 | —.42 | —.40 | —.44 | —.54 |
| 1/2 Dosis | —.30 | —.30 | —.36 | —.29 | —.27 | —.30 | —.40 |
| **Mixtura alcoholica seu Aqua vitae.** | | | | | | | |
| Rp. Spiritus . . . . . . . . . 40,0 | | | | | | | |
| Tinct. Chinae cps. . . . . 3,0 | | | | | | | |
| Aqu. destillat. . . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.33 | —.39 | —.41 | —.42 | —.37 | —.33 | —.39 |
| 1/2 Dosis | —.21 | —.24 | —.31 | —.26 | —.24 | —.21 | —.30 |
| **Mixtura antirheumatica.** | | | | | | | |
| Rp. Natrii salicylici . . . . . 10,0 | | | | | | | |
| Tinctur. Aurantii cort. . . . 5,0 | | | | | | | |
| Aquae destillat. . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.84 | —.94 | 1.05 | —.92 | —.97 | —.84 | —.90 |
| 1/2 Dosis | —.59 | —.59 | —.73 | —.63 | —.64 | —.59 | —.65 |
| **Mixtura diuretica.** | | | | | | | |
| Rp. Liquoris Kalii acetici . . . 30,0 | | | | | | | |
| Olei Petroselini . . . . gtt. II. | | | | | | | |
| Aquae destillat. . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.51 | —.51 | —.62 | —.45 | —.52 | —.51 | —.59 |
| 1/2 Dosis | —.32 | —.32 | —.43 | —.29 | —.33 | —.32 | —.40 |
| **Mixtura gummosa.** | | | | | | | |
| Rp. Mucilag. Gummi arab. | | | | | | | |
| Sirupi simplicis . . . āā 20,0 | | | | | | | |
| Aqu. destillat. . . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.47 | —.67 | —.58 | —.57 | —.58 | —.47 | —.53 |
| 1/2 Dosis | —.28 | —.38 | —.39 | —.33 | —.34 | —.28 | —.35 |
| **Mixtura Natrii bicarbonici.** | | | | | | | |
| Rp. Natrii bicarb. . . . . . . 10,0 | | | | | | | |
| Tinct. Aurant. cort. . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Glycerini . . . . . . . . 10,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.56 | —.54 | —.63 | —.55 | —.57 | —.56 | —.64 |
| 1/2 Dosis | —.43 | —.43 | —.54 | —.42 | —.45 | —.43 | —.55 |

### Mixtura nervina.

Rp. Kalii bromati . . . . . . . 8,0
Natrii bromati
Ammonii bromati . . . āā 4,0
Aqu. destillat. . . . . ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.61 | —.65 | —.74 | —.63 | —.76 | —.61 | —.69 |
| 1/2 Dosis | —.44 | —.46 | —.57 | —.45 | —.53 | —.44 | —.56 |

### Mixtura nitrosa.

Rp. Kalii nitrici . . . . . . . . 6,0
Sir. simpl. . . . . . . . . 30,0
Aqu. destillat. . . . . ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.51 | —.51 | —.67 | —.51 | —.57 | —.51 | —.59 |
| 1/2 Dosis | —.40 | —.40 | —.56 | —.40 | —.46 | —.40 | —.48 |

### Mixtura Pepsini.

Rp. Pepsini . . . . . . . . . . 5,0
Acidi hydrochlor. diluti . . 2,0
Tinct. Aurantii cort. . . . 5,0
Sir. simplic. . . . . . . . 20,0
Aqu. destillat. . . . . ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.82 | 1.12 | 1.17 | 1.— | 1.10 | —.82 | —.99 |
| 1/2 Dosis | —.56 | —.73 | —.81 | —.67 | —.72 | —.56 | —.73 |

### Mixtura solvens.

Rp. Ammon. chlorat. . . . . . 5,0
Succi Liquiritiae depur. . . 2,0
Aquae destillat. . . . ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.57 | —.62 | —.59 | —.40 | —.48 | —.57 | —.55 |
| 1/2 Dosis | —.47 | —.52 | —.51 | —.35 | —.41 | —.47 | —.45 |

### Mixtura solvens stibiata.

Rp. Tartari stibiati . . . . . . 0,05
Ammonii chlorati . . . . . 5,0
Succi Liquiritiae depur. . . 2,0
Aquae destill. . . . . ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.63 | —.70 | —.62 | —.46 | —.51 | —.63 | —.65 |
| 1/2 Dosis | —.53 | —.60 | —.54 | —.41 | —.44 | —.53 | —.55 |

### Mixtura vinosa.

Rp. Tincturae amarae
Tincturae aromaticae . āā 2,0
Sirupi simplicis
Spiritus . . . . . . . āā 25,0
Aquae destillatae . . . ad 200.0
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.50 | —.53 | —.52 | —.55 | —.46 | —.50 | —.63 |
| 1/2 Dosis | —.36 | —.37 | —.40 | —.39 | —.32 | —.36 | —.52 |

### Mixtur vinosa sine sirupo.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.35 | —.37 | —.39 | —.40 | —.34 | —.35 | —.46 |
| ½ Dosis | —.27 | —.27 | —.33 | —.30 | —.26 | —.27 | —.40 |

### Oleum Zinci.

Rp. Zinci oxydati pro usu extern.
Olei Olivarum . . . . ää 25,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.54 | —.49 | —.68 | —.54 | —.58 | —.54 | —.63 |
| ½ Dosis | —.36 | —.36 | —.55 | —.38 | —.45 | —.36 | —.45 |

### Pasta aseptica.

Rp. Acidi salicylici . . . . . . 0,5
Acidi borici pulv. . . . . 5,0
Zinci oxydati ad us. extern. 10,0
Vaselini flavi . . . . ad 50,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.75 | * —.83 | * —.86 | —.59 | * —.78 | —.75 | —.95 |
| ½ Dosis | —.54 | * —.64 | * —.67 | —.47 | * —.57 | —.54 | —.78 |

* c. Ungt. Paraffini.

### Pasta salicylica.

Rp. Acidi salicylici . . . . . . 1,0
Zinci oxydati ad us. extern.
Amyli . . . . . . . . ää 12,0
Vaselini flavi . . . . ad 50,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.67 | * —.77 | * —.80 | —.56 | * —.70 | —.67 | —.86 |
| ½ Dosis | —.49 | * —.59 | * —.62 | —.44 | * —.52 | —.49 | —.73 |

* c. Ungt. Paraffini.

### Pasta Zinci.

Rp. Zinci oxydati ad us. extern.
Amyli Tritici . . . . . ää 12.5
Vaselini flavi . . . . . ad 50,0
M. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.60 | * —.70 | * —.76 | —.50 | * —.66 | —.60 | —.77 |
| ½ Dosis | —.44 | * —.54 | * —.60 | —.39 | * —.50 | —.44 | —.63 |

* c. Ungt. Paraffini.

## Pilulae.

Da in dem Bereich der Taxen e) und g) der Arbeitslohn für die Herstellung der Pillen nicht von je 30 zu 30 Stück wie bei den Taxen a), b), c), d) und f), sondern von je 25 zu 25 Stück steigt, so sind für die Länder Hessen und Elsass-Lothringen aus der in der Ordination vorgeschriebenen Menge von Arzneimitteln, wenn nichts anderes angegeben, statt 30 bezw. 60 bezw. 120 Stück immer nur 25 bezw. 50 bezw. 100 Stück hergestellt und berechnet. Es enthält deshalb jede einzelne Pille um ⅕ mehr wirksame Substanz und muss der Arzt bei der Gebrauchsanweisung in Hessen und Elsass-Lothringen auf diesen Umstand Rücksicht nehmen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pilulae Ammonii sulfo-ichthyolici.** | | | | | | | |
| **Rp.** Ammonii sulfo-ichthyolici. . 12,0<br>Radicis Liquiritiae pulv.<br>Succi Liquiritiae venalis pulv. ãã q. s. ut fiant pilulae 120.<br>Consp. Rad. Liquirit. pulv. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.49 | 2.04 | 1.70 | 1.86 | 1.95 | 1.49 | 1.72 |
| ½ Dosis | 1.07 | 1.17 | 1.32 | 1.05 | 1.27 | 1.07 | 1.35 |
| 100 Pillen aus 10,0 Ichthyol | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.65 | —.— | 1.48 |
| 50 " " 5,0 " | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.06 | —.— | 1.15 |
| (Jede Pille enthält 0,1 Ichthyol.) | | | | | | | |
| **Pilulae aloeticae.** | | | | | | | |
| **Rp.** Aloes . . . . . . . . . 3,0<br>Sap. jalap. . . . . . . . 2,0<br>Spiritus q. s. M. f. pil. No. 30.<br>D. S. Täglich 3—6 Stück. | | | | | | | |
| Dosis . | —.55 | —.65 | —.73 | —.69 | —.61 | —.55 | —.75 |
| ½ Dosis | —.45 | —.55 | —.63 | —.57 | —.51 | —.45 | —.65 |
| **Pilulae asiaticae.** | | | | | | | |
| **Rp.** Acidi arsenicosi . . . . . 0,06<br>Fruct. Piper. nigr. pulv. . . 1,5<br>Succi Liquirit. venal. pulv. . 3,0<br>Glycerini q. s.<br>M. f. pil. No. 60.<br>(Jede Pille enthält 0,001 Acid. arsenicos.) | | | | | | | |
| Dosis . | —.54 | —.73 | —.89 | —.73 | —.70 | —.54 | —.60 |
| ½ Dosis | —.44 | —.61 | —.76 | —.71 | —.56 | —.44 | —.50 |
| **Pilulae Atropini.** | | | | | | | |
| **Rp.** Atropini sulfurici . . . . . 0,01<br>Succi Liquiritiae depurati . 1,5<br>Radicis Liquiritiae pulver. q. s. ut fiant pilulae 30.<br>D. ad scat. ordinar.<br>S. Abends 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.45 | —.55 | —.61 | —.55 | —.52 | —.45 | —.63 |
| ½ Dosis | —.39 | —.50 | —.53 | —.55 | —.51 | —.39 | —.59 |
| 25 Pillen aus 0,0083 Atropin. | —.— | —.— | —.— | —.— | —.52 | —.— | —.63 |
| **Pilulae bechicae Heimii.** | | | | | | | |
| **Rp.** Extr. Helenii . . . . . . 3,0<br>Rad. Ipecacuanh. pulv.<br>Fol. Digital. . . . . . ãã 0,6<br>Opii pulv. . . . . . . . 0,36<br>Rad. Liquirit. pulv. q. s. ut f. pilul. 30. | | | | | | | |
| Dosis . | —.96 | —.93 | 1.14 | 1.15 | —.92 | —.96 | 1.21 |
| ½ Dosis | —.70 | —.81 | —.87 | —.86 | —.67 | —.70 | —.98 |

### Pilulae Chinini cum Ferro.

Rp. Chinin. sulfur. . . . . . . 1,5
Ferr. reduct. . . . . . . . 5,0
Extr. Gentian. . . . . . . 2,5
Rad. Gentian. q. s.
M. f. pil. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.91 | 1.01 | 1.19 | 1.16 | 1.04 | —.91 | 1.11 |
| ½ Dosis | —.62 | —.69 | —.82 | —.80 | —.67 | —.62 | —.79 |

### Pilulae contra tussim.

Rp. Morph. hydrochlor. . . . . 0,06
Rad. Ipecacuanh. . . . . . 0,2
Stib. sulfur. aur. . . . . . 0,3
Sacch. alb.
Rad. Liquirit. pulv. . . . āā 1,5
Aq. dest. q. s.
M. f. pil. No. 30. — D. S. Dreimal täglich 1 Pille.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.56 | —.64 | —.65 | —.70 | —.56 | —.56 | —.90 |
| doppelte | —.70 | —.77 | —.81 | —.85 | —.73 | —.70 | 1.01 |
| 4fache . | 1.03 | 1.10 | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.03 | 1.31 |

### Pilulae expectorantes.

Rp. Terpini hydrati . . . . . . 3,0
Radicis Liquiritiae pulv. . . 1,0
Succi Liquiritiae venal. pulv. 2,0
Glycerini q. s.
M. f. pil. No. 30. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.56 | —.66 | —.72 | —.66 | —.62 | —.56 | —.60 |
| doppelte | —.84 | —.94 | 1.01 | —.94 | —.93 | —.84 | —.85 |

### Pilulae Ferri arsenicosi.

Rp. Ferri reducti . . . . . . . 3,0
Acidi arsenicosi . . . . . . 0,06
Fruct. Piperis nigri pulv.
Succi Liquirit. venal. pulv. āā 1,5
Glycerini q. s.
M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.63 | —.80 | 1.01 | —.89 | —.81 | —.63 | —.91 |
| ½ Dosis | —.50 | —.67 | —.84 | —.72 | —.62 | —.50 | —.80 |

### Pilulae Ferri citrici.

Rp. Ferri citrici oxydati . . . . 5,0
Extracti Gentianae . . . . 3,0
Radicis Gentianae q. s.
M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.82 | —.92 | —.93 | —.92 | 1.07 | —.82 | 1.— |
| ½ Dosis | —.53 | —.63 | —.69 | —.63 | —.68 | —.53 | —.71 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pilulae Ferri lactici.** | | | | | | | |
| Rp. Ferri lactici . . . . . . . . 5,0<br>Extracti Gentianae . . . . 3,0<br>Radicis Gentianae q. s.<br>M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.67 | —.77 | —.88 | —.77 | —.82 | —.67 | —.85 |
| 1/2 Dosis | —.45 | —.55 | —.66 | —.55 | —.56 | —.45 | —.63 |
| **Pilulae Ferri peptonati.** | | | | | | | |
| Rp. Ferri peptonati dialysati sicci 5,0<br>Extracti Gentianae . . . . 3,0<br>Radicis Gentianae pulv. q. s.<br>M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.82 | 1.17 | 1.03 | —.92 | —.82 | —.82 | 1.— |
| 1/2 Dosis | —.53 | —.75 | —.74 | —.63 | —.56 | —.53 | —.71 |
| **Pilulae Ferri reducti.** | | | | | | | |
| Rp. Ferri reducti . . . . . . . 5,0<br>Extracti Gentianae . . . . 3,0<br>Radicis Gentianae pulv. q. s.<br>M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.67 | —.77 | 1.03 | —.92 | —.82 | —.67 | —.85 |
| 1/2 Dosis | —.45 | —.55 | —.74 | —.63 | —.56 | —.45 | —.63 |
| **Pilulae Ferri sulfurici Blaudii.** | | | | | | | |
| Rp. Ferri sulfurici sicci pulv.<br>Kal. carbon. . . . . . . . āā 9,0<br>Tragac. pulv. . . . . . . . 1,2<br>Aqu. dest. q. s.<br>M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.72 | —.79 | —.84 | —.79 | —.72 | —.72 | —.89 |
| 1/2 Dosis | —.48 | —.58 | —.63 | —.58 | —.51 | —.48 | —.70 |
| doppelte | 1.32 | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.16 | 1.32 | 1.33 |
| **Pilulae Ferri cum Magnesia.** | | | | | | | |
| Rp. Ferri sulfurici sicci pulv. . . 9,0<br>Magnesiae ustae . . . . . . 1,0<br>Glycerini q. s.<br>M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 2 Pillen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.54 | —.64 | —.72 | —.64 | —.60 | —.54 | —.74 |
| 1/2 Dosis | —.40 | —.50 | —.58 | —.50 | —.46 | —.40 | —.60 |

## Pilulae Guajacoli.

**Rp.** Guajacoli . . . . . . . . . 6,0
Cerae citrinae . . . . . . . 2,0
Succi Liquiritiae venal. pulv.
Radicis Liquiritiae pulv. ää 3,0
Glycerini q. s. ut fiant pilul. 120,0
Consp. pulv. rad. Liquiritiae.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | 1.79 | 2.09 | 2.12 | 1.89 | 1.43 | 1.79 | 2.15 |
| 1/2 Dosis | 1.12 | 1.27 | 1.29 | 1.22 | 1.19 | 1.12 | 1.50 |
| 100 Pillen aus 5,0 Guajacoli | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.32 | —.— | 1.90 |
| 50 „ „ 2,5 „ | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.08 | —.— | 1.33 |

(Jede Pille enthält 0,05 Guajacoli.)

## Pilulae hydragogae Heimii.

**Rp.** Gutti pulv.
Fol. Digital.
Bulb. Scillae pulv.
Stibii sulfur. aur.
Extr. Pimpinellae . . . . ää 0,7
Glycerini qu. s.
M. f. pil. No. 30.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.68 | —.85 | —.80 | —.81 | —.61 | —.68 | —.99 |

## Pilulae Hydrargyri bichlorati.

**Rp.** Hydrargyri bichlorati . . . 0,2
Boli albae praeparatae . . . 6,0
Glycerini q. s.
M. f. pilul. No. 60. — D. S. Dreimal täglich 1 Pille.
(3 Pillen enth. 0,01 Hydrarg. bichlor.)

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.48 | —.60 | —.66 | —.60 | —.54 | —.48 | —.70 |
| 1/2 Dosis | —.38 | —.50 | —.56 | —.50 | —.44 | —.38 | —.60 |

## Pilulae laxantes fortes.

**Rp.** Extr. Colocynth. . . . . . . 0,25
Extr. Aloes
Sap. Jalap. . . . . . . . ää 2,5
Spiritus q. s.
M. f. pilul. No. 30. — D. S. Täglich 2—5 Stück.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.86 | —.96 | —.96 | 1.01 | —.81 | —.86 | 1.06 |
| 1/2 Dosis | —.62 | —.72 | —.74 | —.74 | —.59 | —.62 | —.82 |

## Pilulae Pepsini cum Acido hydrochlorico.

Rp. Pepsini
Acidi hydrochlorici . . . ãã 12,0
Boli albae . . . . . . . . 6,0
Radicis Liquiritiae q. s. ut fiant pilulae No. 120.
Consp. bolo alba.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | 1.29 | 1.83 | 1.91 | 1.58 | 1.71 | 1.29 | 1.54 |
| $^1/_2$ Dosis | —.81 | 1.23 | 1.29 | 1.14 | 1.24 | —.81 | 1.15 |
| $^1/_4$ Dosis | —.56 | —.83 | —.89 | —.75 | —.84 | —.56 | —.90 |
| 100 Pillen mit 10,0 Pepsin | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.46 | —.— | 1.35 |
| 50 „ „ 5,0 „ | —.— | —.— | —.— | —.— | 1.04 | —.— | 1.— |
| 25 „ „ 2,5 „ | —.— | —.— | —.— | —.— | —.69 | —.— | —.78 |

(Jede Pille enthält Pepsini et Acidi hydrochlorici ãã 0,1.)

## Pilulae Rhei.

Rp. Rad. Rhei pulv. . . . . . . 10,0
Glycerini . . . . . . . . . 5,0
M. f. pilul. No. 30. — D. S. Täglich 3—5 Stück.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.69 | —.99 | 1.03 | —.79 | —.98 | —.69 | —.85 |
| $^1/_2$ Dosis | —.49 | —.69 | —.78 | —.64 | —.68 | —.49 | —.65 |

## Pulvis emeticus.

Rp. Tartar stibiat. . . . . . . . 0,1
Rad. Ipecacuanh. pulv. . . . 1,5
M. f. pulvis.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dosis . | —.41 | —.51 | —.46 | —.52 | —.38 | —.41 | —.55 |
| 2 Dosen . | —.59 | —.71 | —.76 | —.74 | —.59 | —.59 | —.70 |
| 3 Dosen . | —.79 | —.86 | 1.03 | 1.01 | —.77 | —.79 | —.90 |

## Pulvis exsiccans.

Rp. Zinci oxydati ad us. extern.
Amyli . . . . . . . . ãã 25,0
M. f. pulvis. — D. S. Aeusserlich. Streupulver.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.37 | —.42 | —.41 | —.36 | —.41 | —.37 | —.46 |
| $^1/_2$ Dosis | —.27 | —.32 | —.31 | —.27 | —.31 | —.27 | —.37 |

## Pulvis haemorrhoidalis.

Rp. Fol. Sennae ostindic. pulv.
Magnes. ustae
Sacchar. alb. pulv.
Sulfur. depur.
Tartar. depur. . . . . . ãã 10,0
M. f. pulv. — D. S. Dreimal täglich 1 gestrichenen Theelöffel.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E. L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis . | —.80 | —.95 | —.75 | —.80 | —.69 | —.80 | —.95 |
| $^1/_2$ Dosis | —.54 | —.64 | —.50 | —.55 | —.46 | —.54 | —.73 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pulvis laxans.** | | | | | | | |
| Rp. Hydrarg. chlorati mitis . . 0,2<br>Tuber. Jalap. pulv.<br>Sacch. alb. pulv. . . . . ãã 1,2<br>M. f. pulvis. | | | | | | | |
| 1 Dosis . | —.35 | —.38 | —.29 | —.39 | —.29 | —.35 | —.40 |
| 2 Dosen . | —.40 | —.43 | —.38 | —.43 | —.38 | —.40 | —.41 |
| 3 Dosen . | —.48 | —.46 | —.44 | —.50 | —.44 | —.48 | —.49 |
| **Pulvis Plumeri.** | | | | | | | |
| Rp. Hydrarg. chlor. mit.<br>Stibii sulfur. aur.. . . . ãã 0,05<br>Sacch. alb. pulv. . . . . . 0,5<br>Rad. Althaeae pulv.. . . . 0,2<br>M. f. pulvis. | | | | | | | |
| Dosis (10 Pulver) . | —.84 | —.66 | —.72 | —.76 | —.62 | —.84 | 1.05 |
| ½ Dosis (5 Pulver) | —.59 | —.56 | —.52 | —.56 | —.47 | —.59 | —.80 |
| **Pulvis stomachicus.** | | | | | | | |
| Rp. Bismut. subnitrici<br>Rad. Rhei . . . . . . ãã 5,0<br>Natrii bicarbonici . . . . . 20,0<br>M. f. pulv. — D. S. Dreimal täglich 1 Bohne gross zu nehmen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.74 | —.90 | 1.05 | —.89 | 1.10 | —.74 | —.80 |
| ½ Dosis | —.47 | —.57 | —.63 | —.55 | —.65 | —.47 | —.55 |
| **Saturatio simplex.** | | | | | | | |
| Rp. Liquoris Kalii carbonici . . 15,0<br>Aceti . . . . . . . . . . 80,0<br>Sirupi simplicis . . . . . . 15,0<br>Aquae destillat. . . . ad 200,0<br>D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.65 | —.61 | —.69 | —.66 | —.74 | —.65 | —.73 |
| ½ Dosis | —.49 | —.47 | —.55 | —.52 | —.62 | —.49 | —.61 |
| **Solutio Acidi tannici.** | | | | | | | |
| Rp. Acidi tannici . . . . . . . 5,0<br>Aquae destillatae . . . . . 25,0<br>Glycerini . . . . . . . . 20,0<br>D. S. Zum Pinseln. | | | | | | | |
| Dosis . | —.40 | —.47 | —.59 | —.49 | —.56 | —.40 | —.53 |
| ½ Dosis | —.31 | —.37 | —.51 | —.38 | —.45 | —.31 | —.45 |
| **Solutio Jodi Lugol. aquosa.** | | | | | | | |
| Rp. Kalii jodati . . . . . . . . 5,0<br>Jodi . . . . . . . . . . . 2,0<br>Aquae destillatae . q. s. ad 200,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 1.14 | 1.20 | 1.04 | 1.10 |
| ½ Dosis | —.64 | —.64 | —.83 | —.69 | —.75 | —.64 | —.70 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solutio Jodi Lugol. spirituosa.** | | | | | | | |
| Rp. Kalii jodati . . . . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Jodi . . . . . . . . . . 2,0 | | | | | | | |
| Spiritus . . . . . . . . . 20,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . q. s. ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.11 | 1.14 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.19 |
| 1/2 Dosis | —.70 | —.71 | —.85 | —.77 | —.79 | —.70 | —.80 |
| **Solutio Jodi Lugol. cum Tinctura Jodi.** | | | | | | | |
| Rp. Kalii jodati . . . . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Tincturae Jodi . . . . . . 20,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . q. s. ad 200,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.13 | 1.23 | 1.39 | 1.23 | 1.29 | 1.13 | 1.19 |
| 1/2 Dosis | —.69 | —.74 | —.90 | —.74 | —.80 | —.69 | —.75 |
| **Solutio Natrii nitrici.** | | | | | | | |
| Rp. Natrii nitrici . . . . . . . 8,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . . . ad 200,0 | | | | | | | |
| D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. | | | | | | | |
| Dosis . | —.35 | —.35 | —.53 | —.35 | —.43 | —.35 | —.40 |
| 1/2 Dosis | —.29 | —.29 | —.48 | —.29 | —.38 | —.29 | —.35 |
| **Species gynaecologicae Martin.** | | | | | | | |
| Rp. Cort. Frangulae conc. | | | | | | | |
| Fol. Sennae ostindic. conc. | | | | | | | |
| Herb. Millefol. conc. | | | | | | | |
| Rhiz. Graminis conc. . . ãã 25,0 | | | | | | | |
| M. D. S. 1 Esslöffel auf 1 Tasse Thee. | | | | | | | |
| Dosis . | —.88 | —.81 | —.71 | —.68 | —.63 | —.88 | —.89 |
| 1/2 Dosis | —.54 | —.55 | —.47 | —.44 | —.42 | —.54 | —.62 |
| **Species nervinae.** | | | | | | | |
| Rp. Fol. Menthae pip. conc. | | | | | | | |
| " Trifol. fibrin. conc. | | | | | | | |
| Rad. Valerian. conc. ãã ad 100,0 | | | | | | | |
| D. S. 1 Esslöffel auf 1 Tasse Thee. | | | | | | | |
| Dosis . | —.98 | —.92 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | —.98 | 1.11 |
| 1/2 Dosis | —.60 | —.59 | —.63 | —.62 | —.62 | —.60 | —.69 |
| **Spiritus Calami.** | | | | | | | |
| Rp. Olei Calami . . . . . . . . 0,75 | | | | | | | |
| Spiritus . . . . . . . . 70,0 | | | | | | | |
| Aquae destillatae . . . ad 100,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.34 | —.48 | —.41 | —.50 | —.46 | —.34 | —.43 |
| 1/2 Dosis | —.24 | —.30 | —.33 | —.32 | —.30 | —.24 | —.34 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spiritus Kreosoti.** | | | | | | | |
| Rp. Kreosoti . . . . . . . . . 2,0<br>Spiritus Vini gallici (artificial. siehe Vorschrift) . . . . ad 100,0<br>M. D. S. Theelöffelweise zu geben.<br>(Jeder Theelöffel enthält 0,1 Kreosot.) | | | | | | | |
| Dosis . | —.53 | —.57 | —.52 | —.65 | —.50 | —.53 | —.73 |
| 1/2 Dosis | —.42 | —.42 | —.42 | —.48 | —.36 | —.42 | —.62 |
| **Spiritus peruvianus.** | | | | | | | |
| Rp. Balsami peruviani . . . . 20,0<br>Spiritus . . . . . . . . . 40,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.76 | 1.12 | 1.08 | —.86 | 1.24 | —.76 | —.80 |
| 1/2 Dosis | —.41 | —.54 | —.64 | —.46 | —.57 | —.41 | —.45 |
| **Spiritus Rusci.** | | | | | | | |
| Rp. Olei Rusci empyreum.<br>Spiritus . . . . . . . āā 25,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.21 | —.24 | —.33 | —.32 | —.27 | —.21 | —.25 |
| 1/2 Dosis | —.14 | —.15 | —.27 | —.20 | —.19 | —.14 | —.20 |
| **Spiritus triplex.** | | | | | | | |
| Rp. Liquoris Ammonii caustici<br>Olei Terebinthinae<br>Spiritus camphorati āā q. s. ad 100,0<br>M. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.57 | —.53 | —.53 | —.45 | —.76 | —.57 | —.63 |
| **Spiritus Vini gallici.** | | | | | | | |
| Rp. Tinctur. aromat. . . . . . . 0,4<br>Spir. aeth. nitrosi . . . . 0,5<br>Tinct. Ratanh. . . . . gtt. VI.<br>Spiritus . . . . . . . . 100,0<br>Aquae destillatae . . . ad 200,0<br>M. D. S. | | | | | | | |
| Dosis . | —.54 | —.66 | —.54 | —.59 | —.59 | —.54 | —.70 |
| 1/2 Dosis | —.40 | —.44 | —.42 | —.52 | —.40 | —.40 | —.58 |
| **Tinctura amara acida.** | | | | | | | |
| Rp. Acid. hydrochlorici . . . . 5,0<br>Tinct. amar.. . . . . . . 25,0<br>M. D. S. Dreimal täglich 15 Tropfen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.47 | —.49 | —.48 | —.41 | —.38 | —.47 | —.53 |
| 1/2 Dosis | —.28 | —.30 | —.36 | —.26 | —.26 | —.28 | —.34 |
| **Tinctura antidiarrhoica.** | | | | | | | |
| Rp. Tinct. Strychni . . . . . 2,0<br>Tinct. Opii simpl. . . . . 3,0<br>Tinct. Cascarillae . . . . . 10,0<br>M. D. S. Dreimal täglich 15 Tropfen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.42 | —.44 | —.42 | —.39 | —.38 | —.42 | —.50 |
| 1/2 Dosis | —.28 | —.30 | —.33 | —.27 | —.31 | —.28 | —.36 |

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tinctura excitans.** | | | | | | | |
| Rp. Tinctur. Castorei . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Tinctur. Valerian. . . . . 10,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Zweistündlich 10 Tropfen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.51 | —.41 | —.55 | —.51 | —.65 | —.51 | —.55 |
| 1/2 Dosis | —.29 | —.24 | —.38 | —.29 | —.38 | —.29 | —.33 |
| **Tinctura Kreosoti.** | | | | | | | |
| Rp. Kreosoti . . . . . . . . . 6,0 | | | | | | | |
| Tinct. Gentian. . . . . . 24,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Dreimal täglich 5 Tropfen. | | | | | | | |
| (5 Tropfen enthalten 0,05 Kreosot.) | | | | | | | |
| Dosis . | —.67 | —.72 | —.74 | —.65 | —.64 | —.67 | —.71 |
| 1/2 Dosis | —.39 | —.39 | —.47 | —.36 | —.37 | —.39 | —.43 |
| **Tinctura Pepsini.** | | | | | | | |
| Rp. Pepsini . . . . . . . . . . 2,0 | | | | | | | |
| Acidi hydrochlorici diluti . . 4,0 | | | | | | | |
| Tincturae Chinae . . . . ad 30,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Dreimal täglich 20 Tropfen in 1 Weinglase Wasser. | | | | | | | |
| Dosis . | —.68 | —.95 | —.99 | —.79 | —.81 | —.68 | —.66 |
| 1/2 Dosis | —.45 | —.61 | —.71 | —.53 | —.47 | —.45 | —.43 |
| **Tinctura stomachica.** | | | | | | | |
| Rp. Tinctur. amar. | | | | | | | |
| Tinctur. Rhei aqu. | | | | | | | |
| Tinctur. Zingiber. . . . āā 10,0 | | | | | | | |
| M. D. S. Dreimal täglich 30 Tropfen. | | | | | | | |
| Dosis . | —.49 | —.49 | —.50 | —.43 | —.40 | —.49 | —.55 |
| 1/2 Dosis | —.30 | —.30 | —.35 | —.26 | —,25 | —.30 | —.36 |
| **Unguentum Chrysarobini.** | | | | | | | |
| Rp. Chrysarobini . . . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Vaselini flavi . . . . . . 45,0 | | | | | | | |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | 1.16 | * 1.26 | * 1.35 | —.98 | * 1.50 | 1.16 | 1.30 |
| 1/2 Dosis | —.69 | *—.79 | *—.88 | —.60 | *—.91 | —.69 | —.83 |
| * c. Ungt. Paraffini. | | | | | | | |
| **Unguentum contra decubitum.** | | | | | | | |
| Rp. Zinci sulfur.. . . . . . . . 2,5 | | | | | | | |
| Plumbi acet.. . . . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Tinct. Myrrhae . . . . . . . 1,0 | | | | | | | |
| Vasel. flavi . . . . . . . ad 50,0 | | | | | | | |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.78 | *—.92 | *—.91 | —.71 | *—.81 | —.78 | 1.02 |
| 1/2 Dosis | —.57 | *—.71 | *—.70 | —.56 | *—.60 | —.57 | —.81 |
| * c. Ungt. Paraffin. | | | | | | | |

## Unguentum contra Perniones seu camphoratum.

**Rp.** Camphorae tritae . . . . . 5,0
Vaselini flavi . . . . . ad 50,0
M. f. ungt. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis | —.79 | *—.86 | *—.98 | —.58 | *—.90 | —.79 | —.93 |
| 1/2 Dosis | —.51 | *—.59 | *—.70 | —.40 | *—.61 | —.51 | —.65 |

* c. Ungt. Paraffin.

## Unguentum Ichthyoli.

**Rp.** Ammonii sulfo-ichthyolici . 10,0
Adipis suilli . . . . . . . 40,0
M. f. ungt. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis | 1.16 | 1.63 | 1.20 | 1.08 | 1.20 | 1.16 | 1.35 |
| 1/2 Dosis | —.86 | —.97 | 1.— | —.72 | —.80 | —.86 | 1.05 |

## Unguentum Jodi.

**Rp.** Jodi . . . . . . . . . . . . 0,5
Kalii jodati . . . . . . . . 2,5
Aquae destillatae . . . . . 2,0
Adipis suilli . . . . . . ad 25,0
M. f. ungt. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis | —.80 | —.91 | —.81 | —.81 | —.76 | —.80 | 1.— |
| 1/2 Dosis | —.56 | —.71 | —.61 | —.61 | —.55 | —.56 | —.88 |

## Unguentum Jodoformii.

**Rp.** Jodoformii . . . . . . . . 2,5
Vaselini flavi . . . . . ad 25,0
M. f. ungt. D. S. Aeusserlich.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis | —.69 | *—.92 | *—.93 | —.65 | *—.91 | —.69 | —.83 |
| 1/2 Dosis | —.46 | *—.62 | *—.67 | —.43 | *—.61 | —.46 | —.60 |

* c. Ungt. Paraffin.

## Unguentum ophthalmicum.

**Rp.** Hydrarg. oxyd. flav.. . . . 0,1
Vaselini flavi . . . . . ad 10,0
M. f. ungt. D. S. Augensalbe.

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosis | —.34 | *—.46 | *—.53 | —.32 | *—.43 | —.34 | —.50 |
| 1/2 Dosis | —.92 | *—.41 | *—.48 | —.29 | *—.38 | —.29 | —.45 |

* c. Ungt. Paraffin.

(In Bayern, Württemberg und Elsass-Lothringen empfiehlt sich die Verordnung von Ungt. ophthalmicum compositum, da für letzteres Präparat ein Preis, und zwar für 10 gr. 20 Pf. in den Taxen **b)** und **c)** bezw. 30 Pf. in Taxe **g)** ausgeworfen ist.)

| | Pr. V.St. | Bay. | Wü. | Sa. | He. | Me. | E.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unguentum Veratrini.** | | | | | | | |
| **Rp.** Veratrini . . . . . . . . . 0,25 | | | | | | | |
| Olei Olivarum q. s. | | | | | | | |
| Adipis suilli . . . . . . ad 25,0 | | | | | | | |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.65 | —.82 | —.71 | —.67 | —.71 | —.65 | —.83 |
| 1/2 Dosis | —.47 | —.60 | —.56 | —.57 | —.53 | —.47 | —.65 |
| **Unguentum Wilkinsonii seu contra Scabiem.** | | | | | | | |
| **Rp.** Cretae laevig. . . . . . . . 5,0 | | | | | | | |
| Sulfur. sublimati | | | | | | | |
| Ol. Rusci empyreum . . . āā 7,5 | | | | | | | |
| Sapon. virid. | | | | | | | |
| Adipis . . . . . . . . . āā 15,0 | | | | | | | |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.59 | —.66 | —.63 | —.56 | —.50 | —.59 | —.85 |
| **Unguentum Wilsonii.** | | | | | | | |
| **Rp.** Zinci oxydati ad us. extern. 5,0 | | | | | | | |
| Adipis benzoati . . . . ad 50,0 | | | | | | | |
| M. f. ungt. D. S. Aeusserlich. | | | | | | | |
| Dosis . | —.92 | 1.02 | —.88 | —.78 | —.78 | —.92 | 1.08 |
| 1/2 Dosis | —.58 | —.68 | —.66 | —.51 | —.56 | —.54 | —.74 |

# 3. Handverkaufstaxe für Arzneistoffe.

(Die kleinste der angegebenen Gewichtsmengen ist als Dosis parva, die nächst grössere als Dosis magna, die ev. dritte als Dosis maxima zu verordnen.)

| | | |
|---|---|---|
| Acetum | 200 Gramm | —.10 |
| | 500 „ | —.25 |
| „ pyrolignosum crudum | 200 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.25 |
| „ „ rectificatum | 200 „ | —.30 |
| | 500 „ | —.50 |
| Acidum boricum crystalisat. | 50 „ | —.20 |
| | 100 „ | —.30 |
| „ „ pulver. | 20 „ | —.10 |
| | 50 „ | —.20 |
| „ carbolicum crudum | 100 „ | —.20 |
| | 500 „ | —.75 |
| „ „ liqu. (zu Händen des Arztes) | 100 „ | —.60 |
| | 250 „ | 1.— |
| „ hydrochloricum crudum | 200 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.20 |
| „ nitricum crudum | 100 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.50 |
| „ sulfuricum crudum | 100 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.25 |
| „ tannicum | 20 „ | —.25 |
| | 50 „ | —.45 |
| „ tartaricum pulver. | 20 „ | —.20 |
| Aether | 100 „ | —.40 |
| | 250 „ | —.75 |
| Alcohol absolutus | 100 „ | —.50 |
| Alumen pulver. | 50 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.15 |
| „ ustum pulver. | 15 „ | —.10 |
| | 50 „ | —.25 |
| Ammonium chlorat. | 15 „ | —.10 |
| Amylum Oryzae oder Tritici | 100 „ | —.20 |
| Aqua Calcariae | 200 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.20 |
| „ carbolisata, Creolini et Lysoli 1—3 % | 200 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.20 |
| „ „ „ „ „ 4—5 % | 200 „ | —.20 |
| | 500 „ | —.30 |
| „ chlorata | 100 „ | —.15 |
| | 250 „ | —.30 |
| | 500 „ | —.50 |
| „ Picis | 100 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.30 |
| „ Plumbi | 200 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.20 |
| „ Thymoli | 500 „ | —.30 |
| | 1000 „ | —.40 |

| | | |
|---|---|---|
| Asthmacigaretten | 2 Stück | —.10 |
| 1 Schachtel | 12 „ | —.60 |
| Asthmacigarren | 1 „ | —.10 |
| | 12 „ | 1.— |
| Bacilli urethrales gelatinosi c. Resorcino, Thallino, Zinco etc. | 1 „ | —.15 |
| | 12 „ | 1.50 |
| Badesalz, Stassfurter | 1 Kilo | —.10 |
| | 25 „ | 2.— |
| Badesalze nach den bei Einreichung der Rechnung vorzulegenden Detail-Preislisten der Lieferanten. | | |
| Balsamum peruvianum | 10 Gramm | —.25 |
| | 30 „ | —.60 |
| Borax pulver | 20 „ | —.10 |
| | 50 „ | —.25 |
| | 100 „ | —.40 |
| Brunnen, natürliche, u. deren Präparate nach den bei Einreichung der Rechnung vorzulegenden Detail-Preislisten d. Lieferanten. | | |
| Brunnen, künstliche, nach den bei Einreichung der Rechnung vorzulegenden Detail-Preislisten der Lieferanten. | | |
| Selter oder Soda (Flaschen dürfen nicht berechnet werden) | ½ Flasche | —.15 |
| Bromwasser Erlenmeyer, nur auf besondere Verordnung | 1 „ | 1.— |
| Cacao sine oleo | 100 Gramm | —.75 |
| | 250 „ | 1.50 |
| Calcaria chlorata | 100 „ | —.10 |
| | 500 „ | —.40 |
| Calcium sulfuricum ustum (Gyps) | 500 „ | —.20 |
| Capsulae Balsam. Copaivae 0,6 cum scat. | 10 Stück | —.30 |
| | 30 „ | —.75 |
| „ „ „ et Extr. Cub. aeth. āā 0,3 „ „ | 10 „ | —.50 |
| | 30 „ | 1.25 |
| „ Creolin, Natr. bicarb. Ol. Jecor. Aselli āā 0,1 „ „ | 30 „ | —.90 |
| | 100 „ | 2.— |
| Extr. Filicis 0,6 „ „ | 10 „ | —.60 |
| | 20 „ | 1.— |
| „ „ „ 0,1 „ „ | 10 „ | 1.— |
| „ „ „ 2,0 „ „ | 5 „ | 1.— |
| „ „ „ 5,0 „ „ | 2 „ | —.60 |
| „ „ „ 0,5 et Calomel 0,05 „ „ | 12 „ | —.75 |
| „ „ „ 0,5 et Extr. Granat. 0,1 „ „ | 12 „ | —.75 |
| „ „ „ 0,5 et Kosin. 0,1 „ „ | 12 „ | 2.— |
| „ „ „ 1,0 et Ol. Ricini 2,0 „ „ | 10 „ | 1.50 |
| „ Guajacol 0,05 et Bals. tolut. 0,2 „ „ | 30 „ | —.90 |
| | 100 „ | 2.50 |
| „ Ichthyol. 0,25 „ „ | 10 „ | —.75 |
| „ „ 0,5 „ „ | 10 „ | 1.— |
| „ Kreosot. 0,05 Bals. tolut. 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,1 „ „ 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,15 „ „ 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,05 et Ol. Amygd. 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,1 „ „ „ 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ 0,15 „ „ „ 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ 0,05 et Ol. Jecor. 0,2 „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |

| | | |
|---|---|---|
| Capsulae Kreosot. 0,1 et Ol. Jecor. 0,2 . . . . . . cum scat. | 50 Stück | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,15 „ „ „ 0,2 . . . . . . . „ „ | 50 „ | 1.— |
| | 100 „ | 1.50 |
| „ „ 0,05 Natr. bicarb. Ol. Jecor. Aselli āā 0,2 . . . . . . . „ „ | 30 „ | —.90 |
| | 100 „ | 2.— |
| (Ohne besondere Angabe der Gewichtsmenge des Kreosots wird **0,05** gegeben.) | | |
| Capsulae Methylen. caerul. 0,1 . . . . . . . . . . cum scat. | 10 „ | —.75 |
| „ Ol. Eucalypti 0,3 . . . . . . . . . . . „ „ | 10 „ | —.60 |
| „ „ ligni Santali ostind. 0,3 . . . . . . . . „ „ | 10 „ | —.60 |
| | 30 „ | 1.60 |
| „ „ „ „ „ 0,5 . . . . . . . . „ „ | 10 „ | —.80 |
| | 30 „ | 2.10 |
| „ „ Terebinth. rect. 0,5 . . . . . . . . . „ „ | 10 „ | —.25 |
| Carrageen conc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 Gramm | —.15 |
| | 100 „ | —.30 |
| Cataplasma, deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Stück | —.20 |
| „ französisch . . . . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.25 |
| Charta nitrata . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bogen | 1400 qcm | —.20 |
| „ resinosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ | 1400 „ | —.25 |
| „ sinapisata . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Blatt | —.10 |
| | 3 „ | —.25 |
| „ Stramonii . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bogen | 1400 qcm | —.20 |
| „ „ nitrata . . . . . . . . . . . . . 1 „ | 1400 „ | —.20 |
| Cognac (Spiritus e Vino) echt franz. . . . . . . . . . . . | 100 Gramm | 1.— |
| „ „ „ „ „ „ . 1 Flasche (incl. Glas) | 500 „ | 5.— |
| „ deutscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 „ | —.60 |
| „ „ . . . . . . . . . 1 Flasche (incl. Glas) | $^7/_{10}$ Liter | 3.50 |
| Collodium et elasticum . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 Gramm | —.10 |
| | 50 „ | —.40 |
| | 100 „ | —.60 |
| Cort. Condurango conc. . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 „ | —.25 |
| | 100 „ | —.60 |
| „ Frangulae conc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 „ | —.15 |
| | 100 „ | —.25 |
| | 250 „ | —.50 |
| „ Quercus conc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.50 |
| Creolinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 „ | —.50 |
| | 250 „ | 1.— |
| Electuar. e Senna . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 „ | —.10 |
| | 50 „ | —.30 |
| Elixir Aurant. compositum . . . . . . . . . . . . . . . | 30 „ | —.50 |
| „ e Succ. Liquiritiae . . . . . . . . . . . . . . . | 30 „ | —.30 |
| | 100 „ | —.75 |
| Empl. adhaesiv. extensum . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 qcm | —.10 |
| $^1/_2$ m lang, 20 cm breit | | —.75 |
| 1 „ „ 20 „ „ | | 1.— |
| 2 „ „ 20 „ „ | | 1.50 |
| „ „ american. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 „ | —.25 |
| $^1/_2$ Rolle | 650 „ | 1.10 |
| 1 „ | 1300 „ | 2.20 |
| „ Canthar. ordinarium . . . . . . . . . . . . . . . | 10 Gramm | —.20 |
| „ „ „ et perpet. extensum . . . . . . . . | 25 qcm | —.30 |
| „ Cerussae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 Gramm | —.10 |
| „ „ extensum . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 qcm | —.15 |
| $^1/_2$ m lang, 20 cm breit | | 1.— |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emp. fuscum | | 10 Gramm | —.10 |
| „ „ camphor. | | 10 „ | —.10 |
| „ Hydrargyri american. extensum | | 100 qcm | —.70 |
| | ½ Rolle | 650 „ | 3.— |
| „ Lithargyri extens.. | | 100 „ | —.15 |
| | ½ m lang, 20 cm breit | | 1.— |
| „ oxycroceum | | 10 Gramm | —.10 |
| „ „ extensum | | 100 qcm | —.15 |
| | ½ m lang, 20 cm breit | | 1.— |
| „ sapon. extensum | | 100 „ | —.15 |
| | ½ m lang, 20 cm breit | | 1.— |
| „ „ salicyl. 10 % extensum | | 100 „ | —.20 |
| | ½ m lang, 20 cm breit | | 1.25 |
| „ „ „ 20 % extensum | | 100 „ | —.25 |
| | ½ m lang, 20 cm breit | | 1.50 |
| Emser Pastillen, natürliche | 1 Schachtel | 50 Stück | —.75 |
| Extr. Malti | 1 Glas incl. | 200 Gramm | —.75 |
| „ „ mit Chinin | | | |
| „ „ „ „ und Eisen | | | |
| „ „ „ Eisen | | | |
| „ „ „ Kalk | | | |
| „ „ „ Leberthran | 1 Glas incl. | 200 „ | 1.— |
| „ „ „ „ und Eisen | | | |
| „ „ „ Jod | | | |
| „ „ „ „ und Eisen | | | |
| „ „ „ Pepsin | | | |
| Fehling'sche Lösung | | 100 „ | —.60 |
| Ferr. oxyd. saccharat. | | 30 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.50 |
| Ferr. sulfur. crud. | | 200 „ | —.10 |
| | | 500 „ | —.15 |
| | | 1000 „ | —.25 |
| Flores Chamomill. vulg. | | 30 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.60 |
| | | 250 „ | 1.25 |
| „ Malvae arbor. | | 30 „ | —.20 |
| „ „ sylvestr. | | 30 „ | —.20 |
| „ Sambuci conc. | | 50 „ | —.25 |
| | | 100 „ | —.40 |
| „ Tiliae conc. | | 50 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.35 |
| Folia Menthae pip. conc. | | 30 „ | —.25 |
| | | 100 „ | —.70 |
| „ Salviae conc. | | 30 „ | —.10 |
| | | 100 „ | —.25 |
| „ Sennae Alexandr. oder Ostind. conc. | | 30 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.60 |
| „ Trfolii conc. | | 25 „ | —.10 |
| | | 100 „ | —.30 |
| „ Uvae Ursi conc. | | 30 „ | —.10 |
| | | 100 „ | —.25 |
| Fructus Avenae excort. (Hafergrütze) | | 100 „ | —.15 |
| | | 500 „ | —.50 |
| „ Foeniculi | | 30 „ | —.10 |
| | | 200 „ | —.50 |
| „ Juniperi | | 100 „ | —.10 |
| | | 500 „ | —.40 |
| Glycerinum | | 50 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Glycerinum | 500 | Gramm | 1.— |
| Glycerin-Suppositorien | 1 | Stück | —.15 |
| Herba Absinthii conc. | 30 | Gramm | —.10 |
| | 100 | „ | —.20 |
| „ Millefol. conc. | 30 | „ | —.10 |
| | 100 | „ | —.25 |
| Infusum Sennae comp. | 30 | „ | —.30 |
| | 100 | „ | —.75 |
| Kalium bromat. cryst. | 25 | „ | —.25 |
| | 100 | „ | —.80 |
| „ „ pulver. | 25 | „ | —.25 |
| | 100 | „ | —.80 |
| „ carbon. crud. | 100 | „ | —.15 |
| | 500 | „ | —.50 |
| „ chloricum cryst. und pulver. | 30 | „ | —.20 |
| | 50 | „ | —.30 |
| | 100 | „ | —.50 |
| „ permanganicum | 10 | „ | —.10 |
| | 50 | „ | —.30 |
| „ sulfurat. pro balneo | 100 | „ | —.20 |
| | 500 | „ | —.60 |
| Kosotabletten 1,0 . . . cum scat. | 10 | Stück | —.75 |
| „ 2,0 . . . „ „ | 10 | „ | 1.— |
| Lanolinum | 15 | Gramm | —.15 |
| | 50 | „ | —.50 |
| | 100 | „ | —.90 |
| Lichen Island. conc. | 50 | „ | —.15 |
| | 100 | „ | —.20 |
| Linimentum ammoniat. | 50 | „ | —.20 |
| | 100 | „ | —.30 |
| „ ammoniato-camphor. | 50 | „ | —.30 |
| | 100 | „ | —.50 |
| „ sapon. ammon. | 50 | „ | —.15 |
| | 100 | „ | —.20 |
| „ „ camphor. | 50 | „ | —.25 |
| | 100 | „ | —.50 |
| | 200 | „ | —.80 |
| Liquor ad serum lactis parand. . . . 1 Flasche | 150 | „ | 1.— |
| „ Aluminii acetici | 100 | „ | —.30 |
| | 200 | „ | —.50 |
| „ Ammonii caustic. spir. (Spirit. Dzondii) | 50 | „ | —.30 |
| | 100 | „ | —.50 |
| „ Ferri albuminati | 100 | „ | —.40 |
| „ „ mangan. pepton. | 100 | „ | —.50 |
| 1 Flasche incl. | 500 | „ | 2.— |
| „ „ „ sacchar. | 100 | „ | —.50 |
| 1 Flasche incl. Glas | 500 | „ | 2.— |
| „ „ peptonati | 100 | „ | —.50 |
| 1 Flasche incl. Glas | 500 | „ | 2.— |
| Lycopodium | 15 | „ | —.15 |
| Lysolum . . . incl. Glas | 100 | „ | —.50 |
| „ „ | 250 | „ | 1.— |
| „ „ | 500 | „ | 1.50 |
| „ „ | 1000 | „ | 2.50 |
| Magnesia usta | 10 | „ | —.10 |
| Magnesium carbon. pulver. | 15 | „ | —.10 |
| „ sulfur. | 100 | „ | —.10 |
| Maltum Hordei | 100 | „ | —.15 |
| | 500 | „ | —.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Natrium bicarbon. pulver. | 50 | Gramm | —.15 |
| | 125 | „ | —.20 |
| „ carbon. crud. | 200 | „ | —.10 |
| | 500 | „ | —.20 |
| „ sulfur. pur. | 100 | „ | —.10 |
| Oblaten | 10 | Stück | —.10 |
| Oleum Amygdalar | 30 | Gramm | —.30 |
| „ carbol. mit Ol. Olivar bereitet 1—5 % | 30 | „ | —.30 |
| | 100 | „ | —.70 |
| | 200 | „ | 1.20 |
| „ „ „ „ „ „ 6—10 % | 30 | „ | —.40 |
| | 100 | „ | —.75 |
| „ Hyoscyami | 30 | „ | —.20 |
| | 100 | „ | —.50 |
| „ Jecoris Aselli alb. et flav. | 100 | „ | —.20 |
| | 250 | „ | —.50 |
| „ „ „ ferrat. | 100 | „ | —.60 |
| „ Lini | 50 | „ | —.15 |
| | 100 | „ | —.25 |
| | 200 | „ | —.40 |
| „ Olivarum | 50 | „ | —.20 |
| | 100 | „ | —.40 |
| | 200 | „ | —.60 |
| „ Rapae | 50 | „ | —.15 |
| | 100 | „ | —.25 |
| | 200 | „ | —.40 |
| „ Ricini | 20 | „ | —.10 |
| | 50 | „ | —.20 |
| | 100 | „ | —.35 |
| „ Terebinth. | 50 | „ | —.15 |
| | 100 | „ | —.25 |
| | 200 | „ | —.40 |
| Pflastermulle (Guttapercha) mit Bleipflaster | 200 | qcm | —.40 |
| „ mit Borsäure | 200 | „ | —.40 |
| „ „ Carbolsäure | 200 | „ | —.40 |
| „ „ Jodoform | 200 | „ | —.50 |
| „ „ Quecksilber | 200 | „ | —.50 |
| „ „ „ und Carbolsäure | 200 | „ | —.50 |
| „ „ „ „ Zinkoxyd | 200 | „ | —.60 |
| „ „ Salicylsäure | 200 | „ | —.50 |
| „ „ „ und Quecksilber | 200 | „ | —.75 |
| „ „ Sublimat | 200 | „ | —.40 |
| „ „ Theer | 200 | „ | —.40 |
| „ „ Zinkoxyd | 200 | „ | —.50 |
| „ „ „ und Carbolsäure | 200 | „ | —.50 |
| „ „ „ „ Salicylsäure | 200 | „ | —.60 |
| „ „ „ „ Theer | 200 | „ | —.50 |
| Pilulae Extr. Secalis corn. 0,1 drag. cum scat. | 30 | Stück | 1.25 |
| | 50 | „ | 2.— |
| „ Kreosoti 0,05 cum Cacao vel sacch. obduct. „ „ | 100 | „ | 1.— |
| „ „ 0,1 „ „ „ „ „ „ „ | 100 | „ | 1.25 |
| Pix liquida | 50 | Gramm | —.10 |
| Placenta Sem. Lini pulver. | 100 | „ | —.15 |
| | 500 | „ | —.50 |
| Pulvis aerophor. | 10 | „ | —.10 |
| „ „ getheilt | 1 | Stück | —.10 |
| | 3 | „ | —.25 |
| „ „ laxans | 1 | „ | —.20 |
| | 3 | „ | —.50 |

| | | |
|---|---|---|
| Pulvis Liquiritiae comp. | 30 Gramm | —.20 |
| | 50 „ | —.30 |
| | 100 „ | —.50 |
| „ salicyl. cum Talco | 50 „ | —.15 |
| | 100 „ | —.25 |
| Radix Althaeae conc. | 30 „ | —.15 |
| | 100 „ | —.40 |
| „ Gentian. conc. | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.25 |
| „ Liquiritiae conc. | 30 „ | —.15 |
| | 100 „ | —.35 |
| „ Rhei conc. und pulver. | 10 „ | —.25 |
| | 30 „ | —.65 |
| | 50 „ | 1.— |
| „ Valerian. conc. | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.30 |
| Rhizoma Calami non mund. conc. | 250 „ | —.25 |
| „ Graminis conc. | 50 „ | —.10 |
| | 200 „ | —.20 |
| Sal. carol. fact. cryst. | 100 „ | —.15 |
| | 200 „ | —.20 |
| „ „ „ pulver. | 100 „ | —.25 |
| | 200 „ | —.40 |
| Sapo kalinus | 100 „ | —.20 |
| | 500 „ | —.75 |
| „ viridis | 100 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.50 |
| Seife, Carbol- | 1 Stück | —.25 |
| „ Glycerin- | 1 „ | —.25 |
| „ Ichthyol- | 1 „ | 1.— |
| „ Schwefel- | 1 „ | —.25 |
| „ Schwefel-Theer- | 1 „ | —.25 |
| „ Theer- | 1 „ | —.25 |
| „ Theer- von Berger (nur auf besondere Verordnung) | 1 „ | —.60 |
| „ Thiol- | 1 „ | —.50 |
| Semen Lini | 100 Gramm | —.10 |
| | 500 „ | —.40 |
| „ Phaseoli pulv. (Bohnenmehl) | 50 „ | —.15 |
| | 200 „ | —.40 |
| „ Quercus tost. pulv. (Eichelkaffee) | 100 „ | —.15 |
| | 500 „ | —.50 |
| „ Sinapis pulv. gr. | 50 „ | —.15 |
| | 200 „ | —.40 |
| Sirupus Rubi Idaei | 100 „ | —.25 |
| | 250 „ | —.50 |
| Species aromaticae | 30 „ | —.20 |
| | 100 „ | —.50 |
| „ diureticae | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.30 |
| „ emollientes | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.30 |
| „ laxantes (St. Germain et Hamburg) | 10 „ | —.10 |
| | 30 „ | —.30 |
| | 100 „ | —.75 |
| „ Lignorum | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.25 |
| „ pectorales (Sp. pector. c. fruct., Sp. bechic. und Sp. pector. Frank oder Wegscheider haben gleichen Preis) | 30 „ | —.10 |
| | 100 „ | —.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spiritus caeruleus | | 50 Gramm | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ camphor. | | 50 „ | —.15 |
| | | 100 „ | —.25 |
| | | 200 „ | —.40 |
| „ Formicarum | | 50 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.30 |
| | | 200 „ | —.50 |
| „ russicus | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| | | 250 „ | 1.— |
| „ saponato-camphor. | | 50 „ | —.25 |
| | | 100 „ | —.50 |
| | | 200 „ | —.80 |
| „ saponatus und saponato-kalinus | | 50 „ | —.20 |
| | | 100 „ | —.30 |
| | | 200 „ | —.50 |
| Sinapis | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| Stifte, Alaun- | | 1 Stück | —.25 |
| „ Cupr. alumin. | | 1 „ | —.30 |
| | mit Holzfassung | 1 „ | —.75 |
| „ „ sulfur. | | 1 „ | —.30 |
| | mit Holzfassung | 1 „ | —.75 |
| „ Laminar. | | 1 „ | —.25 |
| | | bis | —.50 |
| „ Zinc. chlor. | | 1 „ | —.75 |
| Stramonium nitr. | | 30 Gramm | —.30 |
| | | 100 „ | 1.— |
| Sublimatpastillen | 1 Glas | 10 Stück | —.75 |
| | 1 „ | 100 „ | 2.50 |
| Succus Liquiritiae crud. | | 50 Gramm | —.25 |
| „ „ dep. in bacillis | | 10 „ | —.10 |
| Talcum pulver. | | 100 „ | —.10 |
| | | 500 „ | —.25 |
| Tartarus depuratus (Cremor tartari) | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| Tinctura Aloes compos. | | 30 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.45 |
| | | 100 „ | —.75 |
| „ amara | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ Arnicae | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ aromat. und Aurantii Cort. | | 30 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.45 |
| | | 100 „ | —.75 |
| „ „ amara | | 30 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.45 |
| | | 100 „ | —.75 |
| Chinae simplex et composita | | 30 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.45 |
| | | 100 „ | —.75 |
| „ Ferri comp. | | 100 „ | —.50 |
| | 1 Flasche incl. Glas | 500 „ | 2.— |
| „ „ pomata | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tinctura Ferri pomata | | 100 Gramm | —.50 |
| „ Myrrhae | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ Rhei aquosa | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ „ vinosa | | 30 „ | —.40 |
| | | 50 „ | —.60 |
| | | 100 „ | 1.— |
| „ Valerianae | | 30 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.30 |
| | | 100 „ | —.50 |
| „ „ aeth. | | 30 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.45 |
| | | 100 „ | —.75 |
| Trochisci Ammon. mur. sine Argento | cum scat. | 30 „ | —.50 |
| „ Morf. mur. 0,005 | „ „ | 12 Stück | —.50 |
| „ Natrii bicarbonici | „ „ | 12 „ | —.30 |
| „ pectoral. (Morf. mur. 0,001, Inf. Ipecac. 0,0015) | „ „ | 12 „ | —.40 |
| „ Santonini | „ „ | 12 „ | —.50 |
| „ Seripari | „ „ | 36 „ | 1.— |
| Tubera Salep pulv. | „ „ | 10 Gramm | —.15 |
| | | 50 „ | —.60 |
| Unguentum acidi boric. 10% | | 15 „ | —.15 |
| | | 50 „ | —.40 |
| „ basilicum | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| „ boro-glycerianatum vel lanolinatum | | 10 „ | —.15 |
| | | 30 „ | —.35 |
| | | 50 „ | —.50 |
| „ carbol. 2% | | 15 „ | —.15 |
| | | 50 „ | —.40 |
| „ cereum seu simplex | | 15 „ | —.15 |
| | | 50 „ | —.40 |
| „ Cerussae und U. Cerussae cum Adipe suillo | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| „ diachylon und U. diachylon cum Vaselino | | 15 „ | —.15 |
| | | 50 „ | —.40 |
| | | 200 „ | 1.40 |
| „ Hydrarg. ciner. | | 15 „ | —.30 |
| | | 50 „ | —.75 |
| „ „ „ c. Lanol. par. | | 15 „ | —.40 |
| | | 50 „ | 1.— |
| „ Kal. jodat. | | 15 „ | —.25 |
| | | 50 „ | —.65 |
| „ leniens | | 15 „ | —.20 |
| | | 50 „ | —.50 |
| „ Paraffini | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| „ Plumbi | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| „ Zinci | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| Vaselinum americanum | | 15 „ | —.10 |
| | | 50 „ | —.30 |
| Vinum album | 1 Flasche incl. | $^{7}/_{10}$ Liter | 1.50 |
| „ camphorat. | | 30 Gramm | —.20 |
| | | 100 „ | —.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vinum Chinae** | | 100 Gramm | —.75 |
| | 1 Flasche incl. | 400 „ | 2.50 |
| „ „ cum Ferro | | 100 „ | —.75 |
| | 1 Flasche incl. | 400 „ | 2.50 |
| „ Coca | 1 „ „ | 100 „ | 1.— |
| „ Condurango | | 100 „ | —.75 |
| | 1 Flasche incl. | 400 „ | 2.50 |
| „ hungaricum | 1 Probeflasche incl. | 100 „ | —.60 |
| | 1/2 Flasche incl. | 3/10 Liter | 1.50 |
| | 1 „ „ | 7/10 „ | 3.— |
| „ Malaga | 1 „ „ | 7/10 „ | 3.— |
| „ Malorum | 1 „ „ | 7/10 „ | —.50 |
| „ Pepsin (Pepsin-Essenz) | 1 „ „ | 150 Gramm | 1.50 |
| „ Port | 1 „ „ | 7/10 Liter | 3.— |
| „ rubrum | 1/2 „ „ | 3/10 „ | 1.— |
| | 1 „ „ | 7/10 „ | 2.— |
| „ Xeres | 1/2 „ „ | 3/10 „ | 1.— |
| | 1 „ „ | 7/10 „ | 2.— |
| Wasserglas, rohes | | 50 Gramm | —.10 |
| | | 250 „ | —.30 |
| | | 500 „ | —.50 |

## Gefässe bei Handverkauf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Runde grüne oder halbweisse Gläser (mit engem oder weitem Halse) | bis | 100 „ | —.05 |
| | „ | 200 „ | —.10 |
| | „ | 300 „ | —.15 |
| | „ | 500 „ | —.20 |
| | „ | 1000 „ | —.30 |
| | „ | 2000 „ | —.45 |
| Gefärbte runde Gläser (mit engem oder weitem Halse) um je 5 Pf. theurer als grüne der entsprechenden Grösse. | | | |
| Sechseckige grüne oder halbweisse Gläser zum äusseren Gebrauche (mit engem oder weitem Halse) | bis | 100 „ | —.10 |
| | „ | 200 „ | —.15 |
| | „ | 300 „ | —.20 |
| | „ | 500 „ | —.25 |
| | „ | 1000 „ | —.40 |
| Gefärbte 6eckige Gläser (mit engem oder weitem Halse) um je 5 Pf. theurer als grüne der entsprechenden Grösse. | | | |
| Gelbe oder graue Kruken | bis | 50 „ | —.05 |
| | „ | 100 „ | —.10 |
| | „ | 200 „ | —.15 |
| | „ | 500 „ | —.25 |

(Patentgläser werden wie weisse Gläser mit Glasstöpsel berechnet.)

# 4. Handverkaufstafel für Instrumente und Bandagen.

| | | |
|---|---|---|
| Augenklappen | 1 Stück | —.50 |
| Augentropfgläser | 1 „ | —.25 |
| Badethermometer | 1 „ | —.60 |
| Ballenringe | 1 „ | —.10 |
| Einnehme-(Mensurir-)Gläser | 1 „ | —.10 |
| Einnehmeröhren | 1 „ | —.15 |
| Eisbeutel, grosse, 25 cm lang | 1 „ | 1.75 |
| „ mittlere, 20 cm lang | 1 „ | 1.50 |
| „ kleine, 16 cm lang | 1 „ | 1.20 |
| Eiskrawatten | 1 „ | —.75 |
| Glasstäbe | 1 „ | —.10 |
| Gummibinden, gewebte, 6—7 cm breit | 1 Meter | 1.— |
| Gummifinger | 1 Stück | —.25 |
| Halseisbeutel, kleine | 1 „ | —.75 |
| Halsschwämme | 1 „ | —.50 |
| Herzeisbeutel | 1 „ | 1.70 |
| Hühneraugenringe | 2 „ | —.10 |
| Inhalationsapparat mit Metallwinkel und Federverschluss | 1 „ | 2.— |
| Irrigator complet (enth. Becher, Schlauch, Mutter- und Klystirrohr mit Hahn) | 1 „ | 2.— |
| Nasendouche nach Weber | 1 „ | 2.— |
| Pinsel, Borsten- | 1 „ | —.25 |
| „ Haar- | 1 „ | —.10 |
| „ „ extra stark auf besondere Verordnung | 1 „ | —.20 |
| „ Hals- | 1 „ | —.50 |
| „ nach Tobold | 1 „ | —.75 |
| Spritzen, Injektions-, mit Hartgummistempel und Glasspitze | 1 „ | —.40 |
| „ „ mit Hartgummistempel und Hartgummispitze | 1 „ | 1.— |
| von Zinn | 1 „ | —.75 |
| „ für Ohren und Nase von Patentgummi | 1 „ | —.50 |
| „ „ „ nach Lucae (nur auf besondere Verordnung) | 1 „ | 1.25 |
| Suspensorien | 1 „ | —.75 |

## 5. Handverkaufstafel für Verbandstoffe.

### Watten.

| | | |
|---|---|---|
| Charpie-Baumwolle, Qualität I | 1 Kilo | 3.— |
| | 500 Gramm | 1.50 |
| | 250 „ | 1.— |
| | 100 „ | —.45 |
| | 50 „ | —.25 |
| | 25 „ | —.15 |
| | 8 „ | —.10 |
| „ „ „ II | 1 Kilo | 2.50 |
| „ „ ungeleimt (Spital- oder Polsterwatte) | 1 „ | 2.— |
| | 500 Gramm | 1.25 |
| „ „ sterilisirte | 100 „ | —.70 |
| | 50 „ | —.50 |
| | 25 „ | —.40 |
| Borsäure-Charpie-Baumwolle 5 % | 1 Kilo | 6.— |
| | 250 Gramm | 1.60 |
| | 100 „ | —.70 |
| | 50 „ | —.40 |
| | 25 „ | —.25 |
| Carbolsäure-Charpie-Baumwolle 5 % | 1 Kilo | 4.50 |
| | 500 Gramm | 2.25 |
| | 250 „ | 1.30 |
| | 100 „ | —.60 |
| | 50 „ | —.40 |
| | 25 „ | —.20 |
| Creolin-Charpie-Baumwolle | 1 Kilo | 5.— |
| | 250 Gramm | 1.50 |
| | 100 „ | —.75 |
| | 50 „ | —.50 |
| | 20 „ | —.25 |
| Eisenchlorid-Charpie-Baumwolle | 1 Kilo | 6.— |
| | 500 Gramm | 3.— |
| | 250 „ | 2.— |
| 1 Glas | 50 „ | —.75 |
| 1 Couvert | 15 „ | —.35 |
| Holzwolle | 1 Kilo | 1.— |
| | 500 Gramm | —.60 |
| | 250 „ | —.35 |
| Holzwollwatte | 1 Kilo | 2.80 |
| | 500 Gramm | 1.50 |
| | 250 „ | —.85 |
| | 100 „ | —.50 |
| Jodoform-Charpie-Baumwolle 4 % | 1 Kilo | 7.— |
| | 500 Gramm | 3.50 |
| | 250 „ | 2.50 |
| | 100 „ | 1.15 |
| | 50 „ | —.60 |
| | 20 „ | —.30 |

| | | |
|---|---|---|
| Jodoform-Charpie-Baumwolle 10 % | 1 Kilo | 10.— |
| | 500 Gramm | 5.— |
| | 250 „ | 3.50 |
| | 100 „ | 1.50 |
| | 50 „ | —.80 |
| | 20 „ | —.50 |
| „ „ „ 30 % | 1 Kilo | 12.— |
| | 500 Gramm | 6.— |
| Salicylsäure-Charpie-Baumwolle 4 % | 1 Kilo | 5.50 |
| | 500 „ | 2.90 |
| | 250 „ | 1.80 |
| | 100 „ | —.80 |
| | 50 „ | —.50 |
| | 25 „ | —.25 |
| | 10 „ | —.15 |
| „ „ „ 10 % | 1 Kilo | 7.50 |
| | 500 Gramm | 3.75 |
| | 250 „ | 2.60 |
| | 100 „ | 1.10 |
| | 50 „ | —.60 |
| | 20 „ | —.30 |
| Sublimat-Charpie-Baumwolle nach Prof. v. Bergmann | 1 Kilo | 4.80 |
| | 500 „ | 2.40 |
| | 250 „ | 1.60 |
| | 100 „ | —.75 |
| | 50 „ | —.40 |
| | 20 „ | —.25 |

## Juten.

| | | |
|---|---|---|
| Jute, ungebleicht cardirt | 1 Kilo | 1.20 |
| | 500 Gramm | —.70 |
| Jute-Charpie in Fellen | 1 Kilo | 2.— |
| | 250 Gramm | —.60 |
| Carbolsäure-Jute 5 % | 1 Kilo | 2.25 |
| | 500 Gramm | 1.25 |
| | 250 „ | —.70 |
| | 100 „ | —.35 |
| Salicylsäure-Jute 5 % | 1 Kilo | 4.— |
| | 500 „ | 2.10 |
| | 250 „ | 1.20 |
| | 100 „ | —.50 |
| Sublimat-Jute | 1 Kilo | 3.— |
| | 500 Gramm | 1.50 |
| | 250 „ | —.90 |
| | 100 „ | —.40 |

## Gazen.

| | | |
|---|---|---|
| Cambric, 120 cm breit, Qualität I | 10 Meter | 5.— |
| „ 120 „ „ „ II | 10 „ | 4.— |
| Carbolgaze, 90 cm breit | 10 „ | 3.— |
| | 5 „ | 2.— |
| | 1 „ | —.50 |
| Dermatolgaze 10 % | 10 „ | 4.50 |
| | 5 „ | 3.— |
| | 1 „ | —.80 |
| „ 20 % | 10 „ | 6.— |
| | 5 „ | 4.— |
| | 1 „ | 1.— |

| | | |
|---|---|---|
| Hydrophiler Stoff, 90 cm breit, Qualität I | 10 Meter | 2.05 |
| | 5 „ | 1.40 |
| | 1 „ | —.40 |
| „ „ 90 „ „ „ II | 10 „ | 1.80 |
| „ „ 90 „ „ „ III | 10 „ | 1.60 |
| Jodoformgaze 10 % | 10 „ | 4.50 |
| | 5 „ | 3.— |
| | 1 „ | —.80 |
| | 1/2 „ | —.50 |
| „ 20 % | 10 „ | 6.— |
| | 5 „ | 4.— |
| | 1 „ | 1.— |
| „ 30 % | 10 „ | 7.— |
| | 5 „ | 5.— |
| | 1 „ | 1.20 |
| „ 50 % | 10 „ | 10.— |
| | 5 „ | 7.— |
| | 1 „ | 1.75 |
| Salicylgaze nach Prof. Paul Bruns jr. | 10 „ | 3.50 |
| | 5 „ | 2.25 |
| | 1 „ | —.55 |
| Steifgaze, 118 cm breit, Qualität I | 10 „ | 2.40 |
| „ 118 „ „ „ II | 10 „ | 2.05 |
| Sublimatgaze nach Prof. v. Bergmann | 10 „ | 3.— |
| | 5 „ | 2.— |
| | 1 „ | —.50 |
| | 1/2 „ | —.30 |
| Borsäure-Lint | 250 Gramm | 2.50 |
| | 1 Meter | 1.10 |
| English Lint | 1 Pfd. engl. | 4.50 |
| | 1 Meter | —.75 |

## Binden.

| | | |
|---|---|---|
| Antiseptische Binden, 6 cm breit, 5 m lang | 1 Stück | —.25 |
| „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.30 |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.40 |
| „ „ extra dicht, 6 cm breit, 5 m lang | 1 „ | —.35 |
| „ „ „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.45 |
| „ „ „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.50 |
| Calico-Binden, 6 cm breit, 5 m lang | 1 „ | —.30 |
| „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.35 |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.40 |
| Cambric-Binden, gebleicht, 5 cm breit, 5 m lang | 1 „ | —.20 |
| „ „ „ 6 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.25 |
| „ „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.30 |
| „ „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.40 |

| Bei 10 und mehr Stück | 5 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm breit |
|---|---|---|---|---|
| per Stück | 18 Pf. | 20 Pf. | 25 Pf. | 30 Pf. |

| | | |
|---|---|---|
| Flanell-Binden, 4 cm breit, 5 m lang | 1 „ | —.80 |
| „ „ 5 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.95 |
| „ „ 6 „ „ 5 „ „ | 1 „ | 1.10 |
| „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | 1.35 |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | 1.60 |

| Bei 10 und mehr Stück | 6 cm | 8 cm | 10 cm breit |
|---|---|---|---|
| per Stück | 70 Pf. | 80 Pf. | 100 Pf. |

| | | |
|---|---|---|
| Flanell-Ersatz-Binden (Baumwollengewebe), 4 cm breit, 5 m lang | 1 „ | —.55 |
| „ „ „ „ 5 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.60 |

| | | |
|---|---|---|
| Flanell-Ersatz-Binden (Baumwollengewebe), 6 cm breit, 5 m lang | 1 Stück | —.65 |
| „ „ „ „ 8 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.75 |
| „ „ „ „ 10 „ „ 5 „ „ | 1 „ | —.85 |
| Bei 10 und mehr Stück: 6 cm 8 cm 10 cm breit, per Stück 50 Pf. 62 Pf. 75 Pf. | | |
| Gaze-Binden, 5 cm breit, 5 m lang . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.13 |
| „ „ 6 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.15 |
| „ „ 8 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.20 |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.20 |
| „ „ 12 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.25 |
| Bei 10 und mehr Stück: 5 und 6 cm, 8 und 10 cm, 12 cm breit, per Stück 11 Pf. 15 Pf. 20 Pf. | | |
| Gips-Binden, 6 cm breit, 5 m lang . . . . 10 Stück in Carton | | 3.— |
| einzelne in Blechdose | | —.40 |
| 3 Stück in Blechdose mit überschüssigem Gips | | 1.— |
| „ „ 8 cm breit, 5 m lang . . . . 10 Stück in Carton | | 4.50 |
| 1 Stück in Blechdose | | —.50 |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ . . . . 10 Stück in Carton | | 5.50 |
| 1 Stück in Blechdose | | —.60 |
| Hydrophile Binden (Mull-Binden), 6 cm breit, 5 m lang . . . | 1 „ | —.15 |
| „ „ „ 8 „ „ 5 „ „ . . . | 1 „ | —.20 |
| „ „ „ 10 „ „ 5 „ „ . . . | 1 „ | —.25 |
| Bei 10 und mehr Stück: 6 cm 8 cm 10 cm breit, per Stück 11 Pf. 15 Pf. 18 Pf. | | |
| Leinen-Binden, 5 cm breit, 4 m lang . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.60 |
| „ „ 6 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . . . . | 1 „ | —.90 |
| Priessnitz'sche Halsbinden für Erwachsene . . . . . . . | 1 „ | 1.35 |
| „ „ „ Kinder . . . . . . . . . | 1 „ | 1.20 |
| Seidenabfall-Binden, 6 cm breit, 5 m lang . . . . . . . . | 1 „ | —.75 |
| „ „ 8 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . | 1 „ | 1.— |
| „ „ 10 „ „ 5 „ „ . . . . . . . . | 1 „ | 1.25 |

## Wasserdichte Stoffe.

| | | |
|---|---|---|
| Billroth-Battist, 80 cm breit . . . . . . . . . . . . . . | 1 Meter | 2.50 |
| | 2000 qcm | —.75 |
| | 500 „ | —.30 |
| Glycerin-Pergamentpapier . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Meter | 1.25 |
| | 5 „ | 5.— |
| Guttaperchapapier, 45 cm breit . . . . . . . . . . . . . | 1 „ | 1.25 |
| Silk protective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 „ | 4.50 |
| | 2500 qcm | 2.20 |
| | 1200 „ | 1.25 |
| | 600 „ | —.65 |

## Diverse.

| | | |
|---|---|---|
| Catgut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Flasche | 1.— |
| Carbol-Nähseide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 „ | 1.— |
| | 1 Carton | —.65 |
| 1 Röllchen | in Glashülse | —.45 |
| Drainageschlauch, carbolisirt roth, englisch, No. 1, 2, 3 . . . . . . . . . . in Flaschen | 1 Meter | 1.80 |
| „ 4, 5 . . . . . . . . . . . „ „ | 1 „ | 2.50 |

## Bemerkung.

Die in den Preistafeln No. 4 für chirurgische Instrumente und No. 5 für Verbandstoffe aufgeführten Preise kommen nur bei dem Detailbezug der bezeichneten Artikel aus Apotheken u. s. w. in Anwendung.

Bei grösserem Bedarfe der in Betracht kommenden Artikel empfiehlt es sich, dieselben auf Grund der im Anhange mitgetheilten Preisliste direct aus der Fabrik zu beziehen und den Herren Aerzten für den Gebrauch zur Verfügung zu halten.

## 6. Allgemeine Bestimmungen für die Herren Apotheker.

§ 1.

Für Rechnungen der Krankenkassen dürfen nur solche Arzneien, Heilmittel, chirurgische Instrumente, Verbandstoffe u. s. w. verabfolgt werden, welche von einem Kassenarzte für zum Empfange freier Kur und Arznei berechtigte Personen durch Recept oder Bestellzettel verordnet sind.

§ 2.

Die Verordnungen müssen auf den seitens der Kassen gelieferten Formularen geschrieben und mit Bezeichnung der Kasse und Buchnummer der Kranken versehen sein.

§ 3.

Wiederholungen auf Grund einer und derselben Verordnung dürfen nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn der Kassenarzt die nochmalige Verabreichung der Arzneien u. s. w. ausdrücklich angeordnet und solches auf der Verordnung oder der Signatur ausdrücklich bescheinigt hat.

§ 4.

Die Verordnungen müssen auf der Rückseite mit dem Stempel der Apotheke abgestempelt werden.

§ 5.

Die Verordnungen sind auszutaxiren
zuerst die Arzneistoffe,
dann die Arbeitspreise,
zuletzt das Gefäss.

Für allenfallsiges Kopiren der Verordnungen in das Receptjournal der Apotheke wird seitens der Kassen **keinerlei** Vergütung geleistet.

§ 6.

Der Mindestpreis der Verordnung beträgt 10 Pf.

§ 7.

Die Handverkaufstaxe tritt stets dann in Kraft, wenn die auf einem Recept verordneten Arzneistoffe für sich allein verschrieben sind, gleichgültig ob lateinisch oder deutsch, ob nach Geld oder Menge.

Eine Berechnung für Dispensation oder für Signiren der Handverkaufsartikel tritt nicht ein.

Die für die Artikel der Handverkaufstaxe nothwendigen Gefässe sind bei der ersten Verordnung nach den bei der Handverkaufstaxe aufgeführten Preisen zu berechnen.

Bei Wiederholungen oder auch Neuverordnung sonstiger Handverkaufsartikel dürfen während eines Vierteljahres neue Gefässe für Handverkaufsartikel nicht in Ansatz gebracht werden.

§ 8.

Bei allen nach der Handverkaufstaxe zu berechnenden Verordnungen bedeutet Dosis 1 resp. parva die erste, Dosis 2 resp. magna die zweite, Dosis 3 resp. maxima die dritte der in der Handverkaufstaxe angegebenen Gewichtsmengen.

§ 9.

Die Gefässverabreichung ist auf das unabweisbare Bedürfniss zu beschränken und sind namentlich nur grüne und halbweisse Gläser, graue und gelbe Kruken, sowie Schachteln ohne Falz zu verwenden und zu berechnen.

Abgetheilte Pulver und abgetheilte Salben, sowie trockene nicht abgetheilte Pulver sind ad chartam, dem Feuchtwerden oder Verderben ausgesetzte Pulver sowie Pillen sind in Schachteln ohne Falz (ad scatulam ordinariam) zu dispensiren.

Abweichungen sind nur zulässig, wenn der ordinirende Kassenarzt auf der Verordnung ausdrücklich anderweite Bestimmung getroffen hat.

Bei den nach der Arzneitaxe zu berechnenden Verordnungen darf im Laufe des Monats für jeden Kranken nur ein Gefäss für innerliche und ein Gefäss für äusserliche Arznei berechnet werden; bei allen weiteren Verordnungen wird der halbe Arzneitaxpreis für Gefässe berechnet.

§ 10.

Die Formulae magistrales sind immer zu berechnen, ob einzeln oder in Mischungen verschrieben, auch wenn der Arzt „fm" nicht dabei geschrieben hat.

Bei Bereitung von Pillen und Salben sind Zusätze seitens des ausführenden Apothekers auf das Nothwendigste zu beschränken.

Die Verwendung von Mucilago Gummi arabici bei Bereitung von Pillen ist zu vermeiden, da die Pillen sonst sehr häufig den Körper ungelöst passiren.

Im Uebrigen wird auf Seite 236 und 327 des Deutschen Arzneibuches, 3. Auflage, sowie auf das Seite 41 bei Pillen bereits Gesagte hingewiesen.

§ 11.

Spezialitäten werden zu Originalpreisen berechnet.

§ 12.

Bei Blutegeln darf keine Dispensation berechnet werden.

§ 13.

Sind von Seiten des Arztes bei einer Verordnung keine Angaben der Mengen der Arzneimittel oder der Dimensionen der Verbandstoffe gemacht, so sind dieselben entweder einzuholen oder die kleinsten Mengen der Handverkaufstafeln zu verabfolgen und zu berechnen.

§ 14.

Für sämmtliche gelieferte Arzneien, mit Ausschluss der Handverkaufsartikel, der chirurgischen Instrumente und der Verbandstoffe, wird in Preussen, Oldenburg, Waldeck, Sachsen, den sächsischen Fürstenthümern, sowie den Hansestädten Hamburg, Bremen, Lübeck ein Rabatt von 10 Prozent, in Bayern, Baden und Hessen ein Rabatt von 20 Prozent, in Elsass-Lothringen und Württemberg ein Rabatt von 30 Prozent in Abrechnung gebracht.

§ 15.

Die sachliche Prüfung und Feststellung der Rechnungen erfolgt durch das Zentralbureau der Kassen.

Reklamationen gegen den festgestellten Betrag müssen spätestens binnen 14 Tagen nach Mittheilung über die Festsetzung des Betrages an die Ortsverwaltung, Filiale, Zahlstelle u. s. w. eingebracht werden.

Anhang.

# Auszug aus der Preisliste der Verbandstoff-Fabrik von Kothe & Pistor

in **Ottensen** bei **Hamburg.**

Dieser Auszug giebt der Kürze wegen nur die gangbarsten Artikel an, die von Krankenkassen gebraucht werden. Die Firma fertigt aber alle Watten, Gazen, Pflaster etc. an, die in der Praxis des Arztes Verwendung finden, liefert auch alle chirurgischen Instrumente, Gummiwaaren und Apparate zur Krankenpflege ohne jeden Aufschlag, ausser Porto, zu reinen Fabrikpreisen.

Hier sei auch die Stelle, an der wir an alle Herren Aerzte die ergebene Bitte richten, sich bei ihrer Privatpraxis auch unserer Firma, die wir genau zu beachten bitten, gefälligst erinnern zu wollen und sich auch bei beabsichtigtem Ankauf chirurgischer Instrumente etc. erst vorher sich unserer Preise hierfür zu versichern, bevor an anderer Stelle Ankauf stattfindet.

**Alle Watten sind von 1 Ko. bis 250 gr. in Packete, von 100 gr. bis 10 gr. in Cartons verpackt.**

| | | 1 Kilo | 500 gr. | 250 gr. | 100 gr. | 50 gr. | 25 gr. | 10 gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verband-Watte** . . . . . . . | I. Qualität | 1.90 | —.95 | —.50 | —.23 | —.14 | —.07 | —.05 |
| | II. „ | 1.75 | —.90 | —.48 | —.20 | —.12 | —.06 | -.04½ |
| | III. „ | 1.45 | —.75 | —.40 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Hospital-Watte**, gebleichte . . . . . . | | 1.45 | —.75 | —.40 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ ungebleichte . . . . . | | 1.35 | —.70 | —.38 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Borsäure-Watte**, 5, 10 oder 20 % | I. Qualität | 2.40 | 1.20 | —.65 | —.26 | —.15 | —.09 | —.06 |
| | II. „ | 2.10 | 1.05 | —.34 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Carbolsäure-Watte**, 5 % . . | I. „ | 2.40 | 1.20 | —.65 | —.26 | —.15 | —.09 | —.06 |
| | II. „ | 2.10 | 1.05 | —.65 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Salicylsäure-Watte**, 4 % . . | I. „ | 2.80 | 1.45 | —.75 | —.33 | —.17 | —.09 | —.06 |
| | II. „ | 2.60 | 1.30 | —.68 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ „ 10 % . . | I. „ | 3.80 | 1.90 | —.95 | —.38 | —.20 | —.12 | —.07 |
| | II. „ | 3.30 | 1.65 | —.83 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Jodoform-Watte**, 4 % . . . . | I. „ | 4.50 | 2.25 | 1.13 | —.52 | —.27 | —.14 | —.08 |
| „ „ 10 % . . . . | I. „ | 6.— | 3.— | 1.50 | —.66 | —.34 | —.18 | —.10 |
| **Sublimat-Watte** . . . . . . . | I. „ | 2.35 | 1.18 | —.62 | —.25 | —.14 | —.09 | —.06 |
| **Jod-Watte**, 10 % . . . . . . . | in Gläsern | —.— | —.— | —.— | —.— | —.65 | —.40 | —.— |
| **Eisenchlorid-Watte** . . . . . . . . . . (Gläser à —.60 und —.30.) | | 3.— | 1.50 | —.75 | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Jute**, gebleichte . . . . . . . . . . . . | | 1.60 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| „ ungebleichte . . . . . . . . . . . | | 1.30 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |
| **Holzwoll-Watte** . . . . . . . . . . . . | | 1.30 | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— | —.— |

## Gazen von $^1/_2$ m bis 1 m sind in Cartons, 5 und 10 m in Packete verpackt.

| | | $^1/_2$ m | 1 m | 5 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hydroph. Verbandstoff** (Mull) | I. Qualität | —.10 | —.18 | —.85 | 1.60 |
| | II. „ | —.09 | —.15 | —.65 | 1.20 |
| | III. „ | —.08 | —.13 | —.60 | 1.10 |
| **Carbolsäure-Gaze** . . . . . | I. „ | —.11 | —.18 | —.85 | 1.60 |
| | II. „ | —.09 | —.14 | —.65 | 1.20 |
| **Jodoform-Gaze,** 5 % . . . . | I. „ | —.14 | —.25 | 1.20 | 2.30 |
| | II. „ | —.12 | —.23 | 1.10 | 2.10 |
| „ „ 10 % . . . . | I. „ | —.18 | —.30 | 1.40 | 2.70 |
| | II. „ | —.15 | —.26 | 1.25 | 2.40 |
| „ „ 20 % . . . . | I. „ | —.22 | —.38 | 1.80 | 3.50 |
| | II. „ | —.19 | —.34 | 1.60 | 3.10 |

(Geringere Qualitäten, die sich noch niedriger stellen, fertigen wir nur auf ausdrückliche feste Bestellung, da sich geringe Qualitäten schlecht reissen.)

| | | $^1/_2$ m | 1 m | 5 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Salicylsäure-Gaze,** 10 %. . . | I. Qualität | —.12 | —.20 | —.95 | 1.80 |
| | II. „ | —.10 | —.18 | —.85 | 1.65 |
| **Sublimat-Gaze** . . . . . . | I. „ | —.09 | —.17 | —.75 | 1.50 |
| | II. „ | —.08 | —.14 | —.65 | 1.20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hydroph. Mullbinden,** I. Qual. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | cm breit, 5 m lang |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Pf. pro Stück. |
| II. „ | $3^1/_2$ | $4^1/_2$ | $5^1/_2$ | $6^1/_2$ | $7^1/_2$ | 8 | 9 | 11 | „ „ „ |
| **Appretirte Gazebinden,** nur I. Qualität | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | „ „ „ |
| **Cambricbinden,** „ I. „ | 8 | 10 | 12 | 14 | $15^1/_2$ | $17^1/_2$ | 19 | 23 | „ „ „ |

**Elastische Tricot-Schlauchbinden,** 1 Rolle à 1 Ko. Mk. 4.—,
6 8 10 cm breit, 5 m lang
45 60 75 Pf. pro Stück.

**Leinenbinden** 5 6 8 10 cm breit, 5 m lang
40 50 60 80 Pf. pro Stück.

**Flanellbinden,** reine Wolle, I. Qualität 4 5 6 7 8 9 10 cm breit, 5 m lang
40 43 50 59 68 75 80 Pf. pro Stück.

**Guttapercha-Papier,** beste engl. Marke, pro Ko. Mk. 15.—, pro Meter Mk. —.90.
„ „ leichter „ „ „ 12.—, „ „ „ —.75.
„ „ dünn „ „ „ 10.—, „ „ „ —.60.

**Sublimat-Pastillen** à Glas (100 Stück) Mk. 1.50, auch Cylinder mit 5 Stück.

**Inhalations-Apparate,** Stück Mk. 1.50 bis 2.—.

**Irrigator,** komplet, Blechgefäss (1 Liter), Schlauch, Hahn, Klystierrohr, Mutterspritze, Stück Mk. 1.40.

Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer & Co. in Hamburg.